



GEDEON RICHTER PLC

Asutatud 1901

Ohutusala teabekiri

05.05.2015

Haloperidol-Richter 5 mg/ml süstelahust tohib manustada ainult intramuskulaarselt

Lugupeetud apteegi juhataja!

Kokkuleppel Ravimiametiga informeerime Teid, et ravimi Haloperidol-Richter 5 mg/ml süstelahuse manustamistee on muutunud ning enam ei ole lubatud ravimit manustada intravenoosselt. Uuest ohutusalasest teabest lähtudes tohib nüüdsest Haloperidol- Richter 5 mg/ ml süstelahust manustada vaid intramuskulaarselt.

Antud muutus algatati tuginedes Ameerika Ühendriikide Ravimiameti poolt antud hinnangule, et ravimi intravenoosne manustamine võib suurendada QT-intervalli pikenemise ja *Torsades de pointes*'i tekkeriski.

Vastav muutus on kinnitatud nüüd ka Ravimiameti poolt ning viidud sisse ravimiinfodesse. Hetkel on saadaval veel ravim, mille sise- ja välispakendil on kirjas eelnevalt kehtinud info (IM ja IV manustamistee), pakendi infolehes on aga toodud juba uus teave (ainult IM manustamistee). Kinnitatud ravimiinfo leiab ka [ravimiregistrist](#).

Eeldatavasti jõuab õige märgistusega pakend müügile 2015. aasta III. kvartalis.

Küsimuste korral võtke palun ühendust Richter Gedeon Eesti filiaaliga: tel 608 5301, ravimiohutuse telefon 745 6277.

Lugupidamisega

Richter Gedeon Eesti Filiaal

Istvan Ban