PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Albendasool, 200mg, 400mg, tahke suukaudne ravimvorm

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on albendasool ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne albendasooli võtmist
3. Kuidas albendasooli võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas albendasooli säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on albendasool ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine albendasool on sellele tundlike parasiitinfektsioonide raviks kasutatav preparaat.

2. Mida on vaja teada enne albendasooli võtmist

Ärge võtke albendasooli:

- kui olete albendasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline
- kui teil on allergia mõne albendasooli sarnase ravimi vastu (näiteks mebendasool)
- kui olete või kahtlustate, et olete rase või toidate rinnaga

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

<u>Enne albendasooli võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:</u>
- kui teil on olnud maksahaiguseid
- kui teil on olnud vereloomehaiguseid
- kui teil on silmahaaratusega või neurotsüstitserkoos

Muud ravimid ja albendasool

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriline ettevaatus on vajalik, kui albendasooli kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:
- epilepsiaravimitega (karbamasepiin, fenütoiin, fenobarbitaal, primidoon)
- Histamiini retseptori antagonistidega (allergiaravimid, tsimetidiin)
- HIV ravimitega (ritonaviir)
- Teatavad parasiitide vastased ravimid (levamisool)

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos albendasooliga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

Albendasooli võtmine koos toidu, joogi ja alkoholiga

Ravimit tuleks võtta koos toiduga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Ärge tarvitage ravimit kui olete rase, imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda.

3. Kuidas albendasooli võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate albendasooli rohkem kui ette nähtud

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või keegi teine on võtnud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

Kui te unustate albendasooli võtta

Võtke unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate TOIMEAINE võtmise

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Albendasool võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid

Väga sagedased (≥ 1/10)
- Peavalu
- Maksa transaminaaside tõus

Sagedased (≥ 1/100 kuni < 1/10)
- Kõhuvalu
- Iiveldus, oksendamine
- Pearinglus
- Kõrgenenud koljusisene rõhk
- Meningeaalärritus

- Ajutine juustekadu
- Palavik

Harvad (< 1/100)
- Lööve
- Urtikaaria
- Agranülotsütoos
- Aplastiline aneemia
- Luuüdi supressioon
- Pantsütopeenia
- Trombotsütopeenia
- Hepatiit
- Maksapuudulikkus
- neerupuudulikkus

Kõrvaltoimetest teatamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas albendasooli säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Säilitamise kohta vt infot pakendilt

6. Muu teave

Abiained vt pakendilt.

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatudjaanuaris 2025.