PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Alfa-2a-peginterferoon, süstelahus süstlis 90 mcg 0,5ml; 135 mcg 0,5ml

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on alfa-2a-peginterferoon ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne alfa-2a-peginterferooni kasutamist
3. Kuidas alfa-2a-peginterferooni kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas alfa-2a-peginterferooni säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on alfa-2a-peginterferoon ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine alfa-2a-peginterferoon on pika toimeajaga interferoon. Interferoon on valk, mis muudab organismi immuunvastust, aitamaks võidelda nakkuste ja raskete haiguste vastu ning samuti takistamaks vähirakkude kasvu.
Alfa-2a-peginterferooni kasutatakse tõelise polütsüteemia või essentsiaalse trombotsüteemia raviks täiskasvanutel.
Tõeline polütsüteemia ja essentsiaalne trombotsüteemia on harva esinevad vähitüübid, mille puhul luuüdi toodab liiga palju vere punaliblesid, valgeliblesid ja vereliistakuid (rakud, mis aitavad verel hüübida).

2. Mida on vaja teada enne alfa-2a-peginterferooni kasutamist

Ärge võtke alfa-2a-peginterferooni**:**

- kui olete alfa-2a-peginterferooni, mõne teise interferooni või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline;
- kui teil on kunagi olnud südamelihaseinfarkt või te olete viimase kuue kuu jooksul viibinud tugeva rindkerevalu tõttu haiglaravil;
- kui teil on või on kunagi olnud autoimmuunhaigus (nt reumatoidartriit, psoriaas või põletikuline soolehaigus);
- kui teil on ravile allumatu kilpnäärmehaigus;
- kui teil esineb kaugelearenenud maksahaigus ning teie maksafunktsioon on halvenenud (nt teie nahk on muutunud kollaseks);
- kui patsient on alla 3-aastane laps;
- kui patsient on laps, kellel on kunagi olnud raske psühhiaatriline häire, näiteks raske depressioon või enesetapumõtted;
- kui te olete nakatunud nii C-hepatiidi viiruse kui inimese immuunpuudulikkuse viirusega ning teie maksafunktsioon on halvenenud (nt teie nahk on muutunud kollaseks);
- kui te saate ravi telbivudiiniga, mis on B-hepatiidi ravim

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne alfa-2a-peginterferooni kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekri või meditsiiniõega:
- kui teil on olnud raskekujuline närvisüsteemi- või psüühikahäire;
- kui teil on kunagi esinenud depressioon või depressiooni ilmingud, nt kurbus, masendus jms;
- kui te olete täiskasvanu, kellel esineb või on esinenud ainete (nt alkoholi või uimastite) kuritarvitamist;
- kui teil on psoriaas, see võib Pegasys'ega ravi ajal süveneda;
- kui teil esineb mõni muu maksahaigus peale B- või C-hepatiidi;
- kui teil on suhkurtõbi või kõrge vererõhk, arst võib teid silmade kontrollile kutsuda;
- kui teile on öeldud, et teil on VKH (Vogt-Koyanagi-Harada) sündroom;
- kui te põete kilpnäärmehaigust, mis ei allu hästi ravile;
- kui teil on kunagi esinenud aneemia ehk kehvveresus;
- kui teile on siirdatud elund (maks või neer) või on siirdamine plaanis lähiajal;
- kui te olete samaaegselt nakatunud HIV-ga ja saate raviks HIV-vastaseid preparaate;
- kui teil on eelnev C-hepatiidi ravi katkestatud aneemia või madala vererakkude arvu tõttu.

Pärast alfa-2a-peginterferooniga ravi alustamist pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga:
- kui teil tekivad depressiooni ilmingud (nt kurbus, masendus jms) (vt lõik 4);
- kui märkate muutusi nägemises;
- kui teil tekivad külmetushaiguse või muu hingamisteede nakkuse sümptomid (nt köha, palavik või hingamisraskus);
- kui arvate, et olete haigestunud (nt kopsupõletikku), sest Pegasys'ega ravi ajal võib olla ajutiselt suurem vastuvõtlikkus infektsioonhaigustele;
- kui teil tekib verejooks või ebaharilikud verevalumid, pidage otsekohe nõu oma arstiga;
- kui teil tekivad selle ravimi kasutamise ajal tõsise allergilise reaktsiooni nähud (nt hingamisraskus, vilistav hingamine või nõgeslööve), pöörduge otsekohe arsti poole;
- kui teil ilmnevad Vogt-Koyanagi-Harada sündroomi sümptomid; teil esinevad kaebustena kaelajäikus, peavalu, naha või juuste värvi kahvatus, silma kahjustused (nt ähmane nägemine) ja/või kuulmishäired (nt kumin kõrvus).

Ravi ajal võtab arst regulaarselt vereproove, et kontrollida teid valgete vereliblede (infektsiooni vastu võitlevad rakud), punaste vereliblede (hapnikku transportivad rakud) ja vereliistakute (verehüübimises osalevad rakud) arvu, glükoosisisalduse (veresuhkru tase), maksafunktsiooni või muude laboratoorsete väärtuste muutuste suhtes.

Alfa-2a-peginterferooni ja ribaviriini kombinatsioonravi saavatel patsientidel on kirjeldatud hamba- ja igemekahjustusi, mis võivad viia hammaste kaotuseni. Lisaks võib pikaajalise alfa-2a-peginterferooni ja ribaviriini kombinatsioonravi käigus tekkival suukuivusel olla hambaid ja suuõõne limaskesta kahjustav toime.
Hambaid tuleb korralikult puhastada kaks korda päevas, samuti tuleb regulaarselt käia hambaarsti vastuvõtul. Lisaks võib mõnedel patsientidel tekkida oksendamine. Kui te peaksite oksendama, tuleb pärast seda korralikult suud loputada.

Lapsed ja noorukid

Näidustus tõelise polütsüteemia ja essentsiaalse trombotsüteemia raviks
alfa-2a-peginterferooni ei tohi kasutada lastel ja noorukitel, kuna puudub teave alfa-2a-peginterferooni kasutamise kohta selles vanuserühmas nende näidustuste korral.
Kui ravim sisaldab bensüülalkoholi (vt pakendilt), siis ei tohi seda manustada enneaegsetele ega vastsündinutele. Ravim võib imikutel ja kuni 3-aastastel lastel põhjustada toksilisi või allergilisi reaktsioone.

Muud ravimid ja alfa-2a-peginterferoon

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ärge kasutage alfa-2a-peginterferooni, kui te võtate telbivudiini, sest nende ravimite kombineerimisel suureneb risk perifeerse neuropaatia tekkeks (tuimus, surisemis- ja/või põletustunne kätes ja/või jalgades). Seetõttu on Pegasys'e kombinatsioon telbivudiiniga vastunäidustatud. Teavitage oma arsti või apteekrit sellest, kui te saate ravi telbivudiiniga.

Teatage oma arstile, kui te kasutate ravimeid astma tõttu, kuna astmaravimi annus võib vajada muutmist.

Patsiendid, kes põevad lisaks HIV-nakkust: teavitage oma arsti, kui te saate HIV-nakkuse vastast ravi. HIV-nakkuse korral kasutatava kõrge aktiivsusega retroviirusevastase ravi võimalikeks kõrvaltoimeteks on laktatsidoos ja maksafunktsiooni halvenemine. Kui te saate nimetatud ravi, võib alfa-2a-peginterferooni ja ribaviriini lisamine suurendada riski laktatsidoosi või maksapuudulikkuse tekkeks. Teie arst jälgib teid nende haigusseisundite sümptomite osas. Patsientidel, kes saavad zidovudiini kombinatsioonis ribaviriini või alfainterferoonidega, on suurem risk aneemia tekkeks. Patsientidel, kes saavad asatiopriini kombinatsioonis ribaviriini ja peginterferooniga, on suurem risk raskekujuliste verepildi muutuste tekkeks. Palun lugege kindlasti läbi ka ribaviriini pakendi infoleht.

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos alfa-2a-peginterferooniga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Kui alfa-2a-peginterferooni kasutatakse koos ribaviriiniga, peavad nii mees- kui naispatsiendid rakendama erilisi ettevaatusabinõusid rasedusest hoidumiseks, kui esineb rasestumise võimalus, sest ribaviriin võib olla lootele väga kahjulik:

- kui te olete viljastumisvõimeline naine, kes kasutab alfa-2a-peginterferooni kombinatsioonis ribaviriiniga, peavad enne ravi, igakuiselt ravi ajal ja 4 kuu jooksul pärast ravi lõpetamist tehtud rasedustestid andma negatiivse vastuse. Te peate kasutama usaldusväärset rasestumisvastast meetodit nii ravi ajal kui 4 kuud pärast ravi lõppu. Te saate seda arutada oma arstiga.
- kui te olete mees, kes kasutab alfa-2a-peginterferooni kombinatsioonis ribaviriiniga, ärge olge raseda naisega vahekorras ilma kondoomi kasutamata. See vähendab ribaviriini naise organismi sattumise võimalust. Kui teie naispartner ei ole praegu rase, kuid on viljastumisvõimeline, peab talle tegema rasedustesti igakuiselt ravi ajal ja 7 kuu jooksul pärast ravi lõpetamist. Te peate või teie partner peab kasutama usaldusväärset rasestumisvastast meetodit nii ravi ajal kui 7 kuud pärast ravi lõppu. Te saate seda arutada oma arstiga.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Ei ole teada, kas see ravim eritub rinnapiima. Seetõttu ei tohi alfa-2a-peginterferooni kasutamise ajal last rinnaga toita. Kombinatsioonravi korral ribaviriiniga pöörake tähelepanu ribaviriini sisaldavate ravimpreparaatide infolehte märgitud vastavale teabele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui teil esineb alfa-2a-peginterferooni ravi ajal unisust, väsimust või segasust.

3. Kuidas alfa-2a-peginterferooni kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Ravimit süstitakse naha alla.

Kui te kasutate alfa-2a-peginterferooni rohkem kui ette nähtud

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või keegi teine on kasutanud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

Kui te unustate alfa-2a-peginterferooni kasutada

Kui ravimi manustamine hilineb 1 või 2 päeva, siis manustage ettenähtud annus niipea kui võimalik. Järgmine süst tehke ettenähtud ajal.

Kui ravimi manustamine hilineb 3...5 päeva, manustage ettenähtud annus niipea kui võimalik. Järgmised annused manustage 5-päevase intervalliga, kuni jõuab kätte ravimi manustamiseks ettenähtud nädalapäev.
Näide: te süstite alfa-2a-peginterferooni esmaspäeviti. Reedel meenub teile, et unustasite esmaspäeval ravimit manustada (hilinemine 4 päeva). Süstige ettenähtud annus kohe reedel, järgmine süste tehke kolmapäeval (5 päeva pärast reedest süstet). Järgmine süste tuleb teha esmaspäeval, 5 päeva pärast kolmapäeval tehtud süstet. Nüüd on taas kätte jätte jõudnud ravimi manustamiseks ettenähtud päev ja te saate jätkata ravimi manustamist igal esmaspäeval.

Kui ravimi manustamine hilineb 6 päeva, peate ootama ja manustama annuse järgmisel ravimi manustamiseks ettenähtud päeval.

Pöörduge arsti või apteekri poole, kui vajate abi unustatud annuse manustamise osas.
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui te lõpetate alfa-2a-peginterferooni kasutamise

Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Alfa-2a-peginterferoon võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid

Mõnel inimesel tekib depressioon, kui ta kasutab alfa-2a-peginterferooni ainuravimina või koos ribaviriiniga, ning mõnedel juhtudel on tekkinud enesetapumõtted või agressiivne käitumine (mis võib olla suunatud teiste vastu nagu mõtted teiste elu ohustamisest). Mõni patsient on reaalselt sooritanud enesetapu. Kui teil tekivad depressiooni-ilmingud või enesetapumõtted või muutused käitumises, pöörduge kindlasti erakorralise arstiabi saamiseks haiglasse. Võite paluda pereliiget või lähedast sõpra, aitamaks teid märgata depressiooni-ilminguid või muutusi käitumises.

Kasvamine ja areng (lapsed ja noorukid)
Mõned lapsed ja noorukid, kes said alfa-2a-peginterferooni kroonilise B-hepatiidi raviks 48 nädala jooksul, ei kasvanud ega võtnud kaalus juurde vanusele vastaval määral. Veel ei ole teada, kas pärast ravi lõppu nende oodatav kasv ja kehakaal taastuvad.

Kuni aasta kestnud ravi ajal alfa-2a-peginterferooni ja ribaviriini kombinatsiooniga ei kasvanud mõned kroonilise C-hepatiidiga lapsed ja noorukid ega võtnud kehakaalus juurde oodatud määral. Kuigi suuremal osal lastest taastus oodatav kasv kahe aasta jooksul pärast ravi lõppu ning enamikel ülejäänud lastel kuue aasta jooksul pärast ravi lõppu, on siiski võimalik, et alfa-2a-peginterferoon võib mõjutada lõplikku pikkust täiskasvanuna.

Teatage viivitamatult oma arstile, kui te märkate mõnda järgnevatest kõrvaltoimetest: tugev valu rinnus, püsiv köha, südame rütmihäired, hingamisraskus, segasus, depressioon, tugev kõhuvalu, veri roojas (või must, tõrva meenutav väljaheide), tugev ninaverejooks, palavik või külmavärinad, nägemishäired. Need kõrvaltoimed võivad olla tõsised ja te võite vajada kohest arstiabi.

Alfa-2a-peginterferooni ja ribaviriini kombineeritud ravi väga sagedased kõrvaltoimed (võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel kümnest) on järgmised.
- Ainevahetushäired: isutus
- Psühhiaatrilised ja närvisüsteemi häired: depressioon (masendustunne, madal enesehinnang või lootusetuse tunne), ärevus, unetus, peavalu, keskendumisraskused ja pearinglus
- Hingamisteede häired: köha, õhupuudus
- Seedetrakti häired: kõhulahtisus, iiveldus, kõhuvalu
- Naha kahjustused: juuste väljalangemine ja nahareaktsioonid (sealhulgas sügelus, nahapõletik ja naha kuivus)
- Lihaste ja luude kahjustused: liigese- ja lihasevalu
- Üldised häired: palavik, nõrkus, väsimus, värisemine, külmavärinad, valu, süstekoha ärritusnähud ja kergesti ärritatavus

Alfa-2a-peginterferooni ja ribaviriini kombineeritud ravi sagedased kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni ühel inimesel kümnest) on järgmised.
- Infektsioonid: seen-, viirus- ja bakteriaalsed infektsioonid. Ülemiste hingamisteede infektsioon, bronhiit, suuõõne seennakkus ja herpes (huulte ja suuõõne sageli korduv viirusnakkus)
- Vere häired: madal vereliistakute arv (mõjutab verehüübivust), aneemia ehk kehvveresus (madal punavereliblede arv) ja lümfisõlmede suurenemine
- Hormoonsüsteemi häired: kilpnäärme üle- või alatalitlus
- Psühhiaatrilised ja närvisüsteemi häired: meeleolu muutused/emotsionaalsed häired, agressiivsus, närvilisus, sugutungi vähenemine, mäluhäired, minestus, lihasjõu vähenemine, migreen, tuimus, surisemistunne, põletustunne, värinad, maitsetundlikkuse muutused, hirmuunenäod, unisus
- Silma kahjustused: ähmane nägemine, silmavalu, silmapõletik ja silmade kuivus
- Kõrva kahjustused: kõrvavalu
- Südame ja veresoonte häired: kiire südametegevus, südamekloppimine, jäsemete turse, õhetus
- Hingamisteede häired: koormusel tekkiv õhupuudus, ninaverejooksud, nina- ja neelupõletik, nina- ja ninakõrvalkoobaste (õhuga täidetud ruumid aju- ja näokolju luudes) nakkused, nohu, kurguvalu
- Seedetrakti häired: oksendamine, seedehäire, neelamisraskus, suuõõne haavandid, igemete veritsemine, keele- ja suupõletik, kõhupuhitus (kõhugaasid), suukuivus ja kaalulangus
- Naha kahjustused: lööve, suurenenud higistamine, psoriaas, nõgestõbi, ekseem, suurenenud valgustundlikkus, öine higistamine
- Lihaste ja luude kahjustused: seljavalu, liigesepõletik, lihasnõrkus, luuvalu, kaelavalu, lihasevalu, lihaskrambid
- Reproduktiivse süsteemi häired: impotentsus (võimetus säilitada erektsiooni)
- Üldised häired: valu rinnus, gripitaoline haigus, halb enesetunne, letargia, kuumahood, janu

Alfa-2a-peginterferooni ja ribaviriini kombineeritud ravi aeg-ajalt täheldatavad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni ühel inimesel sajast) on järgmised.
- Infektsioonid: kopsupõletik, nahainfektsioonid
- Hea- ja pahaloomulised kasvajad: maksakasvaja
- Immuunsüsteemi häired: sarkoidoos (põletikulise koe kolded üle kogu organismi), kilpnäärmepõletik

- Hormoonsüsteemi häired: suhkurtõbi (kõrge veresuhkru tase)
- Ainevahetushäired: dehüdratsioon
- Psühhiaatrilised ja närvisüsteemi häired: enesetapumõtted, hallutsinatsioonid, perifeerne neuropaatia (jäsemeid varustavate närvide talitluse häirumine)
- Silma kahjustused: võrkkesta verejooks
- Kõrva kahjustused: kuulmislangus
- Südame ja veresoonte häired: kõrge vererõhk
- Hingamisteede häired: vilisev hingamine
- Seedetrakti häired: seedetrakti verejooks
- Maksa häired: maksatalitluse häired

Alfa-2a-peginterferooni ja ribaviriini kombineeritud ravi harvad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni ühel inimesel tuhandest) on järgmised.
- Infektsioonid: südamelihase põletik, väliskõrva põletik
- Vere häired: punavereliblede, valgevereliblede ja vereliistakute arvu tõsine vähenemine
- Immuunsüsteemi häired: tõsine allergiline reaktsioon, süsteemne erütematoosne luupus (haigus, mille korral organism ründab oma enda rakke), reumatoidartriit (autoimmuunhaigus)
- Hormoonsüsteemi häired: diabeetiline ketoatsidoos (halvasti ravile alluva suhkurtõve tüsistus)
- Psühhiaatrilised ja närvisüsteemi häired: suitsiid, psühhootilised häired (tõsised isiksusehäired ja normaalse sotsiaalse toimetuleku häirumine), kooma (pikaajaline sügav teadvusetus), krambid, näonärvi halvatus (näolihaste nõrkus)
- Silma kahjustused: nägemisnärvi põletik ja turse, võrkkestapõletik, sarvkesta haavand
- Südame ja veresoonte häired: südamelihase infarkt, südamepuudulikkus, valu südames, kiire südamerütm, südame rütmihäired või südame sisekesta ja südamelihase põletik, ajuverejooks ja veresoonte põletik
- Hingamisteede häired: interstitsiaalne pneumoonia (kopsupõletik, sh surmaga lõppev), verehüübed kopsus
- Seedetrakti häired: maohaavand, kõhunäärmepõletik
- Maksa häired: maksapuudulikkus, sapijuhapõletik, rasvmaks
- Lihaste ja luude kahjustused: lihasepõletik
- Neerude häired: neerupuudulikkus
- Vigastus või mürgistus: ravimi üleannustamine

Alfa-2a-peginterferooni ja ribaviriini kombineeritud ravi väga harvad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni ühel inimesel kümnest tuhandest) on järgmised.
- Vere häired: aplastiline aneemia (luuüdis ei toodeta punavereliblesid, valgevereliblesid ja vereliistakuid)
- Immuunsüsteemi häired: idiopaatiline (või trombootiline) trombotsütopeeniline purpur (suurenenud verevalumite, verejooksude teke, vereliistakute arvu vähenemine, kehvveresus ja väga tugev nõrkus)
- Silma kahjustused: nägemise kaotus
- Naha kahjustused: toksiline epidermise nekrolüüs/Stevens-Johnsoni sündroom/multiformne erüteem (mitmesugused erineva raskusega [sh surmaga lõppevad] lööbed, millega võib kaasneda villide teke suus, ninas, silmades ja muudel limaskestadel ning haigusest haaratud nahapiirkonna irdumine), angioödeem (naha ja limaskestade turse)

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed on järgmised.
- Vere häired: isoleeritud erütrotsütaarne aplaasia (raske aneemia vorm, mille korral punaliblede tootmine on vähenenud või lakanud); selle tagajärjel võivad tekkida sellised sümptomid nagu tugev väsimus koos energiapuudusega
- Immuunsüsteemi häired: Vogti-Koyanagi-Harada sündroom – harvaesinev haigus, millele on iseloomulik nägemise kaotus, kuulmislangus ja nahapigmentatsiooni kadumine; maksa- ja neerutransplantaadi äratõukereaktsioon
- Psühhiaatrilised ja närvisüsteemi häired: maania (ülemääraselt kõrgenenud meeleolu episoodid) ja bipolaarsed häired (ülemääraselt kõrgenenud meeleolu episoodide vaheldumine kurbuse ja lootusetuse tundega); teiste elu ohustamise mõtted, ajuinsult
- Silma kahjustused: harvaesinev võrkkesta irdumuse vorm vedelikuga võrkkestas

- Südame ja veresoonte häired: perifeerne isheemia (jäsemete ebapiisav verevarustus)
- Seedetrakti häired: isheemiline koliit (soolte verevarustuse häire), keele värvuse muutused
- Lihaste ja luude kahjustused: tõsine lihaste kahjustus ja valu
- Pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon – haigus, mille korral kopsuveresooned on tugevalt ahenenud ja see põhjustab kõrge vererõhu veresoontes, mis viivad verd südamest kopsu. Haigus võib tekkida eelkõige HIV-infektsiooni või raskete maksaprobleemide (tsirroosi) riskiga patsientidel. See kõrvaltoime võib tekkida erinevatel ajahetkedel ravi ajal, tavaliselt mitu kuud pärast alfa-2a-peginterferooniga ravi alustamist.

Alfa-2a-peginterferooni ainuravimina kasutamisel B- või C-hepatiidiga patsientidel on mõnede nimetatud kõrvaltoimete tekke tõenäosus väiksem.

Kõrvaltoimetest teatamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas alfa-2a-peginterferooni säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Säilitamise kohta vt infot pakendilt

6. Muu teave

Abiained vt pakendilt.

Müügiloa hoidja

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel.

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2025