PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Erütromütsiin, 2% ja 4%, nahalahus

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on erütromütsiin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne erütromütsiini võtmist
3. Kuidas erütromütsiini võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas erütromütsiini säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on erütromütsiin ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine erütromütsiin on antibiootikum, sellel on antibakteriaalne toime. Erütromütsiini nahalahust kasutatakse välispidiseks paikseks raviks nahaabstsessi, nahapaise ja nahamädamuhu, akne, habeme-pseudofollikuliidi, mädase higinäärmepõletiku ja muude täpsustatud ja täpsustamata karvanääpsude haigusseisundite korral.

2. Mida on vaja teada enne erütromütsiini kasutamistt

Ärge kasutage erütromütsiini:

- kui olete erütromütsiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline
- kui te olete allergiline (ülitundlik) teiste makroliidantibiootikumide suhtes

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne erütromütsiini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Vältige ravimi sattumist silma, ninna ja suhu, kuna ravimis sisalduv alkohol võib põhjustada limaskesta ärritust.
Nahaärritust, nt punetus ja põletustunne, võib esineda sagedamini või intensiivsemalt kui kasutada erütromütsiini nahalahust koos teiste alkoholi sisaldavate geelide, lahuste või paiksete puhastusvahendite/seepidega.
Limaskestadele, silmadele, suule, ninasõõrmetele või avatud haavale sattumisel loputada hoolikalt leige veega.
Ärge neelake ravimit alla.
Erütromütsiinil võib esineda osalist ristuvat resistentsust haigusetekitajate osas linkomütsiini ja klindamütsiiniga.

Nagu ka teiste makroliidide puhul, on teatatud rasketest ja harva esinevatest allergilistest reaktsioonidest, sealhulgas äge generaliseeritud eksanteemiline pustuloos. Allergilise reaktsiooni tekkimisel tuleb ravimi manustamine katkestada ja alustada sobivat ravi.

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei ole soovitatav kasutada lastel vanuses kuni 12 aastat, kuna selle ravimi ohtus ja efektiivsus selles vanuses lastel ei ole kindlaks tehtud.

Muud ravimid ja erütromütsiin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Erütromütsiini nahalahust mitte kasutada raseduse ajal, kui arst pole soovitanud teisiti.
Erütromütsiini lahalahust võib kasutada imetamise ajal ettevaatusega. Vältida tuleb imetatava lapse kontakti emal ravitava kehapiirkonnaga, et vältida erütromütsiini sattumist imiku suhu.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole teada, et paikselt nahale manustatav erütromütsiin mõjutaks autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

3. Kuidas erütromütsiini kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arst pole määranud teisiti, siis tuleb kanda erütromütsiini nahalahust kahjustatud nahapiirkonnale õhukese kihina 2 korda päevas pärast naha pesemist ja kuivatamist, vältides ravimi sattumist silma, silmalaugudele, huultele, ninasõõrmetesse. Pärast ravimi kasutamist tuleb pesta käsi.
Ravi erütromütsiini nahalahusega ei tohiks ületada 3 kuud.
Erütromütsoiin on antibiootikum, mistõttu võib pikaajalise kasutamise järel kujuneda haigust põhjustanud bakteritel selle ravimi suhtes resistentsus (bakterite tundlikkuse puudumine ravimile). Sellisel juhul muutuvad bakterid erütromütsiiniga ravimatuks.

Kui te kasutate erütromütsiini rohkem kui ette nähtud

Kui olete nahale määrinud liialt palju erütromütsiini lahust, kuivatage üleliigne tualettpaberit kasutades.
Kui teil tekivad ülitundlikkuse (allergia) sümptomid, peske ravitav piirkond ohtra vee ja seebiga.
Kui teie või keegi teine joob erütromütsiini nahalahust, pöörduge arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

Kui te unustate erütromütsiini kasutada

Unustatud annus kandke nahale niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg kasutada järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Annuste vahele peaks jääma vähemalt 3 tundi. Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake tavapäraste annustega.

Kui te lõpetate erütromütsiini kasutamise

Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võtke kohe ühendust arstiga, kui teil tekib tõsine nahareaktsioon: punetav, mahakooruv nahk koos naha all olevate mügarike ning villidega (eksanteemne pustuloos). Selle reaktsiooni esinemissagedus ei ole teada (olemasolevate andmete põhjal ei ole seda võimalik hinnata).
Erütromütsiini nahalahus võib väga harva põhjustada allergilist reaktsiooni. Sümptomite seas võivad olla lööve, sügelus, suu, näo, huulte või keele turse ning hingamisraskused.
Võtke viivitamatult ühendust arstiga, kui tekivad mainitud kõrvaltoimed.

Erütromütsiini nahalahus võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid: nahaärritus, nahapunetus, põletustunne manustamiskohal, nahakuivus ja kestendamine, mööduvad naha pigmentatsioonihäired, kipitustunne, allergilised reaktsioonid, mis võivad olla rasked.

Kui ravim sisaldab alkoholi, võib algul tekkida naha kuivus, ketendus, punetus, põletustunne ja sügelus. Kui need sümptomid peaksid kestma kauem kui 4...6 päeva, on vajalik põhjuse väljaselgitamine arsti poolt.

Kui teil tekib valulik lööve või põletustunne pärast erütromütsiini kasutamist, mis ei möödu mõne tunni jooksul või ägeneb iga kord, kui te ravimit kasutate, lõpetage ravimi kasutamine ja võtke ühendust arstiga nii pea kui võimalik.

Kõrvaltoimetest teatamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas erütromütsiini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Säilitamise kohta vt infot pakendilt

6. Muu teave

Abiained vt pakendilt.

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2025