PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Pneumokokkidevastane polüsahhariidvaktsiin

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne vaktsineerimist/oma lapse vaktsineerimist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Vaktsiin on välja kirjutatud üksnes teile või teie lapsele. Ärge andke seda kellelegi teisele. Vaktsiin võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on samasugused nagu teil või teie lapsel.
- Kui teil või teie lapsel tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on pneumokokkidevastane polüsahhariidvaktsiin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada, enne kui vaktsineerite ennast või oma last pneumokokkidevastase polüsahhariidvaktsiiniga
3. Kuidas pneumokokkidevastast polüsahhariidvaktsiini kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas pneumokokkidevastast polüsahhariidvaktsiini säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on pneumokokkidevastane polüsahhariidvaktsiin ja milleks seda kasutatakse

Pneumokokkidevastast polüsahhariidvaktsiini kasutatakse selleks, et kaitsta teid või teie last (kes on 2-aastane või vanem), pneumokokkide poolt põhjustatud raskete infektsioonide eest.

Pneumokokid võivad põhjustada kopsuinfektsioone (eeskätt kopsupõletikku), ajukestade ning seljaaju infektsioone (meningiit) ja vereinfektsioone (baktereemia või septitseemia). Vaktsiin aitab teid või teie last kaitsta üksnes nende pneumokokkinfektsioonide eest, mille serotüübid kuuluvad selle vaktsiini koostisse. Vaktsiin sisaldab 23 pneumokoki serotüüpi, , mis põhjustavad peaaegu kõiki (ligikaudu üheksat kümnest) infektsioone, mille tekitajaks pneumokokid on.

Pärast teie või teie lapse vaktsineerimist töötab organismi loomulik kaitsemehhanism välja antikehad, mis aitavad teid/teda kaitsta pneumokokkinfektsioonide eest.

Pneumokokkinfektsioone esineb kõikjal maailmas ja need võivad tekkida igaühel ja igas vanuses, kuid kõige sagedamini on ohustatud
- eakad;
- inimesed, kelle põrn on eemaldatud või ei tööta;
- inimesed, kelle vastupanuvõime infektsioonide suhtes on vähenenud kas pikaajaliste haiguste või infektsioonide tõttu (nt südamehaigus, kopsuhaigus, suhkurtõbi, neeruhaigus, maksahaigus või HIV infektsioon);
- inimesed, kelle vastupanuvõime infektsioonide suhtes on vähenenud seoses raviga, mida nad on saanud mõne muu haiguse tõttu (nt vähk).

Ajukestade ja seljaaju pneumokokkinfektsioonid (meningiit) esinevad mõnikord pärast kolju vigastusi ja koljuluu murde ning väga harva pärast teatud tüüpi kirurgilisi operatsioone. Vaktsiin ei pruugi kaitsta kõigi nende infektsioonide eest.

Samuti võib pneumokokkinfektsioone esineda ninakõrvalkoobastes, kõrvades ja teistes kehaosades. Vaktsiin ei kaitse tõenäoliselt teid või teie last nende vähemtähtsate infektsioonide eest.

2. Mida on vaja teada, enne kui vaktsineerite ennast või oma last pneumokokkidevastase polüsahhariidvaktsiiniga

Pneumokokkidevastane polüsahhariidvaktsiin on mõeldud kasutamiseks ainult isikutel, kes on vähemalt 2 aasta vanused, sest noorematel lastel ei pruugi vaktsiinile tekkiv vastusreaktsioon olla piisavalt tugev.

Selleks, et veenduda vaktsiini sobivuses teile või teie lapsele, on tähtis rääkida oma arstile või meditsiiniõele, kui mõni allpool loetletud punktidest kehtib teie või teie lapse kohta. Kui te ei saa kõigest täpselt aru või ei ole kindel, paluge seda endale selgitada oma arstil või meditsiiniõel. Sarnaselt teistele vaktsiinidele ei pruugi ka pneumokokkidevastane polüsahhariidvaktsiin täielikult kaitsta kõiki, kellele see on manustatud.

Pneumokokkidevastast polüsahhariidvaktsiini ei tohi kasutada, kui olete või kui teie laps on pneumokokkidevastase polüsahhariidvaktsiini või selle vaktsiini mis tahes koostisosade (loetletud pakendil) suhtes allergiline (ülitundlik).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne vaktsineerimist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:
- kui teil või teie lapsel on infektsioon koos kõrge kehatemperatuuriga; võimalik, et vaktsineerimine tuleb edasi lükata, kuni olete tervenenud/teie laps on tervenenud.

Samuti rääkige oma arstile enne vaktsineerimist:
- kui teil või teie lapsel on vähenenud vastupanuvõime infektsioonide suhtes ravikuuri tõttu (näiteks vähiravimid või kiiritusravi);
- kui teil või teie lapsel on pikaajaline haigus või infektsioon, mille tõttu võib olla vähenenud vastupanuvõime pneumokokkinfektsioonide suhtes.
- Kui teil esineb vere hüübimishäire (hematoomid tekivad kergesti ning verejooks ei kipu peatuma)

Neil juhtudel on võimalik, et vaktsineerimine tuleb edasi lükata ja isegi siis ei pruugi see tagada nii head kaitset kui tervete inimeste puhul.

65-aastased ja vanemad isikud ei pruugi meditsiinilisi sekkumisi taluda nii hästi kui nooremad inimesed. Seetõttu ei saa välistada, et mõnedel vanematel isikutel võib reaktsioone esineda sagedamini ja/või need võivad olla raskemad.

Muud ravimid ja pneumokokkidevastane polüsahhariidvaktsiin
Teatage oma arstile või apteekrile, kui teie või teie laps kasutab, on hiljuti kasutanud või kavatseb kasutada mis tahes muid ravimeid.

Pneumokokkidevastast polüsahhariidvaktsiini tohib manustada samaaegselt gripivaktsiiniga, eeldusel et kasutatakse erinevaid süstekohti. Enamikul inimestest tekib vastus mõlemale vaktsiinile samaaegselt, nii et neil kujuneb kaitse mõlema infektsiooni vastu.

Et saada rohkem teavet pneumokokkidevastase polüsahhariidvaktsiini ja Zostavax'i (tuulerõugevaktsiin) samaaegse manustamise kohta, pidage nõu oma arsti või tervishoiutöötajaga.

Kui te saate või kui teie laps saab juba ravi antibiootikumidega, et ära hoida pneumokokkinfektsiooni, siis ei tohi pärast vaktsineerimist seda ravi katkestada. Samuti on isegi pärast vaktsineerimist tähtis, et te külastaksite arsti ja saaksite kiiresti antibiootikumravi juhul kui arvate, et teil või teie lapsel võib olla mis tahes tüüpi infektsioon ja teile või teie lapsele on öeldud, et risk pneumokokkinfektsiooni tekkeks on suur (näiteks kui põrn on eemaldatud või see ei tööta õigesti).

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle vaktsiini kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Puudub teave, mis viitaks sellele, et see vaktsiin mõjutab teie autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

3. Kuidas pneumokokkidevastast polüsahhariidvaktsiini kasutada

Vaktsineerida tohib arst või meditsiiniõde, kes on läbinud vaktsineerimise koolituse. Vaktsineerima peab tervishoiuasutuses, sest seal on olemas kõik vahendid süstimise korral aeg-ajalt esineda võivate raskete allergiliste reaktsioonide raviks.

Kasutage seda vaktsiini alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Vaktsiin tuleb süstida lihasesse või sügavale naha alla. Teie arst või meditsiiniõde jälgib, et ta ei süstiks vaktsiini teile või teie lapsele naha sisse ega veresoonde.

Mõnikord manustatakse vaktsiini enne (tavaliselt vähemalt kaks nädalat varem) plaanilisel operatsioonil põrna eemaldamist või spetsiifilise vähiravi alustamist. Kui teil või teie lapsel on juba alustatud või läbitud spetsiifiline ravi, siis võidakse vaktsineerimine ligikaudu kolme kuu võrra edasi lükata.

HIV-positiivsetele inimestele tehakse vaktsineerimine tavaliselt niipea, kui testitulemused on teada.

Teile või teie lapsele manustatakse üks annus vaktsiini. Vaktsiini teine annus manustatakse tavaliselt mitte varem kui kolm aastat pärast esimest annust. Terved inimesed tavaliselt ei vaja teist annust, kuid isikutele, kellel on suurenenud risk tõsiste pneumokokkinfektsioonide tekkeks (nt need, kellel puudub põrn või kelle põrn ei tööta hästi), on soovitatav manustada ka teine annus, tavaliselt 3 kuni 5 aastat pärast esimest annust. Korduva annuse manustamine ei ole tavaliselt soovitatav enne 3 aasta möödumist esimesest annusest, sest sel juhul on kõrvaltoimete risk suurem.

Teie arst või meditsiiniõde otsustab, kas ja millal te vajate või teie laps vajab järgmist vaktsiini annust.

Kui te kasutate pneumokokkidevastast polüsahhariidvaktsiini rohkem, kui ette nähtud
Vaktsiini üleannustamisest ei ole teatatud. Üleannustamine on väga ebatõenäoline, sest vaktsiin on saadaval üheannuselises viaalis ning seda süstib arst või meditsiiniõde.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik vaktsiinid ja ravimid, võib ka pneumokokkidevastane polüsahhariidvaktsiin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allergilised reaktsioonid
Peate kiiresti otsima arstiabi, kui teil või teie lapsel tekib pärast vaktsineerimist ükskõik milline allpool loetletud sümptomitest või mõni muu tõsine sümptom:
- hingamisraskus, keele või huulte muutumine sinakaks;

- madal vererõhk (põhjustab pearinglust) ja minestus;
- palavik, üldine halb enesetunne koos liigesevalude või isegi liigeste turse ja põletikuga ja lihasevalu;
- näo, huulte, keele ja/või kurgu ja kaela paistetus;
- labakäte, labajalgade või pahkluude turse;
- nõgestõbi (põletikulised villid nahal) ja lööbed.

Kui tekib tõsine reaktsioon, siis see avaldub tihti väga kiiresti pärast süstet, kui patsient on alles tervishoiuasutuses.

Kõrvaltoimed
Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st) on süstekoha valulikkus, valu, punetus, kuumus, paistetus ja süstekoha kõvastumine ning palavik. Need reaktsioonid esinevad üldiselt sagedamini pärast vaktsiini teise annuse manustamist, mitte pärast esimest annust.

Muud kõrvaltoimed on järgmised:
Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):
- vaktsineeritud jäseme tugev turse.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):
- vaktsineeritud jäseme liikuvuse vähenemine;
- väsimustunne;
- üldine halb enesetunne;
- kontrollimatu värisemine;
- iiveldus või oksendamine;
- suurenenud ja/või põletikulised lümfisõlmed;
- liigeste valu, põletik ja turse ning lihasevalu;
- teatud tüüpi vereosakeste (vereliistakud) arvu tugev vähenemine inimestel, kellel juba oli nende vähesus teise haiguse tõttu, mida nimetatakse idiopaatiliseks trombotsütopeeniliseks purpuriks (ITP) ja mis põhjustab suurenenud riski veritsuste ja verevalumite tekkeks;
- peavalu, nahatundlikkuse muutused või surin ja torkimistunne, jäseme liikuvuse vähenemine, käte ja jalgade tuimus ja nõrkus (sh haigus nimega Guillaini-Barré sündroom);
- vere põletikunäitaja (C-reaktiivne valk (CRV)) väärtuse suurenemine vereanalüüsis;
- patsientidel, kellel on verehäireid, võivad vere punalibled hakata lagunema, mis põhjustab vere punaliblede arvu tugevat vähenemist (hemolüütiline aneemia);
- teatud tüüpi vere valgeliblede arvu suurenemine;
- tõmblused (krambid), mis on seotud kõrge kehatemperatuuriga.

Kõrvaltoimetest teatamine
Kui teil või teie lapsel tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas pneumokokkidevastast polüsahhariidvaktsiini säilitada

Hoidke seda vaktsiini laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda vaktsiini pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale – vaadake pakendilt.

Täpsemaid säilitustingimusi vaadake pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Abiained

Abiained vt pakendilt.

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2025.