PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Demoksütotsiin, suukaudne ravimvorm

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile

Infolehes antakse ülevaade

1. Mis ravim on demoksütotsiin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne demoksütotsiini kasutamist
3. Kuidas demoksütotsiini kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas demoksütotsiini säilitada
6. Muu teave

1. MIS RAVIM ON DEMOKSÜTOTSIIN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Demoksütotsiin on oksütotsiini (hüpofüüsi tagasagara hormooni) sünteetiline analoog. Ravim põhjustab emaka silelihaste ja piimanäärmete silelihasrakkude kokkutõmbeid. Demoksütotsiin omab tugevamat ja kestvamat toimet võrreldes oksütotsiiniga ja on vastupidavam fermentatiivse inaktivatsiooni suhtes (oksütotsinaasile).
Demoksütotsiinil puuduvad vasopressoorne ja antidiureetiline toime, mis võimaldab ravimit kasutada ka hüpertensiooniga patsientidel ning raseduse teise poole toksikooside ja neerufunktsiooni häirete korral.
Ravim ei lõhustu süljefermentide toimel ja imendub hästi läbi suu limaskesta.

Demoksütotsiini kasutatakse sünnitustegevuse esilekutsumiseks meditsiinilisel näidustusel, sünnitustegevuse stimuleerimiseks, emaka taandarengu (involutsiooni) kiirendamiseks sünnitusjärgsel perioodil ja pärast aborti, laktatsiooni (piima eritumise) stimuleerimiseks ja mastiidi (rinnapõletik) profülaktikaks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE DEMOKSÜTOTSIINI KASUTAMIST

Ärge võtke ravimit
- kui te olete allergiline (ülitundlik) demoksütotsiinile või ravimi mõne koostisosa suhtes
- kui sünnitus loomulikul teel ei ole soovitatud või on vastunäidustatud
- kui on liiga tugevad tuhud

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Beeta-adrenomimeetilised ravimid võivad vähendada demoksütotsiini stimuleerivat toimet emakale. Samaaegselt demoksütotsiiniga ei tohi kasutada teisi sarnase toimega ravimeid.

Oluline teave mõningate demoksütotsiini koostisainete suhtes
Vt pakendis olevast infolehest abiainete loetelu ja pea nõu arsti või apteekriga.

3. KUIDAS DEMOKSÜTOTSIINI KASUTADA

Sünnitustegevuse esilekutsumiseks ja stimuleerimiseks võetakse ravimit 50 IU, 30 minutilise vahega. Regulaarse sünnitustegevuse saavutamisel annust vähendatakse poole võrra või pikendatakse intervalli ravimi annuste vahel (1 tund).
Maksimaalne annus on 500 IU, harvadel juhtudel kuni 900 IU. Kui toimet ei saavutata, võib ravimit 24 tunni pärast uuesti manustada.
Toime puudumisel maksimaalse annuse kasutamisel minnakse üle oksütotsiini süstelahuse manustamisele veenisiseselt.
Laktatsiooni stimuleerimiseks on tavaline annus 25…50 IU, 5 minutit enne imiku toitmist, 2…4 korda ööpäevas, 2…6 päeva pärast sünnitust.

Toimeaine imendumine toimub läbi suu limaskesta.
Tabletid hoitakse suus (ilma vedelikuta), kuni täieliku imendumiseni.

Kui te võtate ravimit rohkem kui ette nähtud
Kuna seda ravimit manustatakse teile haiglas meditsiinipersonali poolt, on ebatõenäoline, et te võtate ravimit rohkem kui ette nähtud..

Kui te unustate ravimit võtta
Kuna seda ravimit kasutatakse arsti järelvalve all, on ravimi annuse vahelejäämine ebatõenäoline. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate ravimi võtmise
Kui sünnitusel on emaka kontraktsioonid saavutanud adekvaatse taseme, võib ravimi kasutamise järk-järgult lõpetada. Kõrvaltoimete kohta andmed puuduvad.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kohta, pidage nõu oma arsti või ämmaemandaga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka demoksütotsiin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sage (esineb kuni ühel patsiendil 10st)
- Iiveldus, oksendamine
- Peavalu, kiire või aeglane südame löögisagedus
- Veritsus emakast

Aeg-ajalt (esineb kuni ühel patsiendil 100st)
- Südame rütmihäired

Harv (esineb kuni ühel patsiendil 1000st)
- Nahalööbed
- Rasked allergilised reaktsioonid peapöörituse ja minestamistunde, nõrkuse või hingamisraskusega
- Sünnitusjärgsed verehüübed

Mõnedel patsientidel on täheldatud isegi väikeste annuste korral emakalihaste spasme. Üleannustamine võib põhjustada emaka väga tugevaid kontraktsioone, emaka rebendeid, kudede kahjustusi. Sellised seisundid võivad olla teie lapsele kahjulikud; võimalik on loote lämbumine ja surm.
Vastsündinul võib esineda nahakollasus (ikterus), silma võrkkesta veritsus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või ämmaemandale.

5. KUIDAS DEMOKSÜTOTSIINI SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Säilitamise kohta vt infot pakendilt.

6. Muu teave

Abiained vt pakendilt.

Müügiloa hoidja
Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel.

Infoleht on viimati kooskõlastatud veebruaris 2025