PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Kortikoreliin, Parenteraalne ravimvorm 0,1mg/ml,

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on kortikoreliin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne kortikoreliini võtmist
3. Kuidas kortikoreliini võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas kortikoreliini säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on kortikoreliinja milleks seda kasutatakse

Toimeaine kortikoreliin on inimese kortikotropiini vabastava hormooni analoog. See stimuleerib adrenokontikotropiini vabastamist hüpofüüsi eesmisest osast, mis omakorda stimuleerib kortisooli vabanemist neerupealistest. Hormoonide tasemete muutused veres pärast kortikoreliini manustamist viitavad kõrge kortisooli taseme tekkepõhjusele – kortikoreliini kasutatakse Cushingi tõve diferentsiaaldisgnostikas ja hüpofüüsi puudulikkuse diagnostikas.

2. Mida on vaja teada enne kortikoreliinivõtmist

Kortikoreliini ei tohi kasutada:

- kui patsient on kortikoreliini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Suuri kortikoreliini annuseid (üle 1 mcg/kg või üle 100mcg) on seostatud kardiovaskulaarsete kõrvaltoimete tekkega, näiteks asüstoolia, hüpotensioon, mööduv tahhükardia ja minestus. Mõju tekib 2-3 minuti jooksul pärast süstet ja kestavad 30-60 minutit. Mitte ületada soovituslikku doosi või manustamiskiirust.

Kortikoreliini kasutamisel on teatatud ülitundlikkusreaktsioonidest, seal hulgas urtikaaria; näo, kaela ja rindkere ülaosa punetus; hingamisraskused; vilisev hingamine; angioödeem. Kõrgeid kortikoreliini doose (üle 3 mcg/kg) on seostatud pikalt kestva punetuse (üle 4 h), hingamisraskuse ja pigistusttundega rinnus. Lõpetage kortikoreliini manustamine, kui ülitundlikkusreaktsioon tekib.

5-10% patsientidest võib esineda valenegatiivne reaktsioon Cushingu tõve korral, mis võib viia valediagnoosini ektoopilise AKTH tootmise osas.

Kui teil tekivad kortikoreliiniga läbiviidava hüpofüüsi stimulatsiooni uuringu ajal või järel sümptomid, nagu äkki tekkiv peavalu, nägemisvälja defekt või kahelinägemine, öelge seda kohe oma arstile.

Neid sümptomeid võib põhjustada hüpofüüsi apopleksia (verejooks), mis on meditsiiniline hädaolukord ja vajab kiiret diagnoosimist ja ravi.

Muud ravimid ja kortikoreliin

Teatage oma arstile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriline ettevaatus on vajalik, kui **kortikoreliini** kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:
- Süsteemsed glükokortikosteroidhormoonid – hiljutine või käimasolev kortikosteroidteraapia võib mõjutada keha vastust kortikoreliinile
- Hepariin – võib suurendada kortikoreliini kõrvaltoimete esinemist. Olulist vererõhu ja südamelöögisageduse langust on seostatud kooskasutamisega.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kortikoreliin võib põhjustada kõrvaltoimeid, mis võivad mõjutada võimet autot juhtida ja masinatega töötada. Kõrvaltoimete esinemisel autot mitte juhtida.

3. Kuidas kortikoreliini võtta

Cushingu sündroomi differentsiaaldiagnostikas on tavaline manustatav doos 1 mcg/kg intravenoosselt 30-60 sekundi jooksul. Ravim manustatakse meditsiinitöötaja poolt.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kortikoreliin võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid

Südame-veresoonkonna häired
Väga sage (üle ≥1/10): õhetus (nägu, kael ja rindkere ülaosa)
Sage (≥1/100 kuni <1/10): Vererõhu langus,
Teadmata: Asüstoolia, palpitatsioonid, raske hüpotensioon, suurenenud südame löögisagedus, teadvusekaotus

Närvisüsteemi häired
Sage (≥1/100 kuni <1/10): Toonilis-kloonilised krambid, mööduvad lõhnatajuhäired
Teadmata: Pearinglus, metallimaitse, hüpofüüsi apopleksia (veritsus)

Seedetrakti häired
Teadmata: Oksendamine, suukuivus

Hingamisteede, rindkere ja mediastiinumi häired
Sage (≥1/100 kuni <1/10): düspnoe
Teadmata: vilistav hingamine, rindkere ahistus

Immuunsüsteemi häired
Harv: ülitundlikkusreaktsioon

Väga harv: anafülaksia
Teadmata: Angioödeem

Kõrvaltoimetest teatamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas kortikoreliini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Säilitamise kohta vt infot pakendilt

6. Muu teave

Abiained vt pakendilt.

Müügiloa hoidja

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel.

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2025