**PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT**

**Pakendi infoleht: teave kasutajale**

**Permetriin, 1% , lahus, šampoon**

# Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

**Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

**Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on permetriin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne permetriini kasutamist
3. Kuidas permetriini kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas permetriini säilitada
6. Muu teave


## 1. Mis ravim on permetriin ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine permetriin on nahaparasiitide vastane ravim, mida kasutatakse sügeliste, peatäide ja muude lestaliste põhjustatud infektsioonide raviks.
Permetriini kasutatakse ainult välispidiselt.

## 2. Mida on vaja teada enne permetriini kasutamist

**Ärge kasutage permetriini:**

- kui olete permetriini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline
- alla 2 kuu vanustel lastel

Teavet selles ravimis sisalduvate abiainete kohta küsige oma arstilt.
Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

**Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Permetriini tohib kasutada ainult välispidiselt. Vältida tuleb lahuse sattumist silma, suhu, jm limaskestadele.
Kui lahus satub silma, tuleb silmi rohke veega loputada.
Allaneelamise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole.
Permetriini sisaldava geeli kasutamine võib süvendada ekseemi.
Kui geeli kasutamise korral tekib teil nahaärritus, lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge arsti poole.
Permetriini mitte kasutada katkisel või sekundaarse infektsiooniga nahal.
Kui esineb ülitundlikkus korvõieliste (nt krüsanteemide) suhtes, kasutage permetriini ainult pärast arstiga konsulteerimist.

**Lapsed ja noorukid**

Ärge kasutage permetriini vastsündinutel ja alla 6-kuustel lastel, välja arvatud juhul, kui arst seda soovitab. Kuni 3-aastaste laste ravi permetriiniga peaks toimuma meditsiinilise järelvalve all.

**Muud ravimid ja permetriin**

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Puudub teave permetriini koostoimete kohta teiste ravimitega.

**Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos permetriiniga.** Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

**Rasedus, imetamine ja viljakus**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Permetriini mõju lootele ei ole uuritud, seepärast võib permetriini kasutada raseduse ajal ainult pärast konsulteerimist arstiga, kes oskab arvestada kõiki võimalikke riske.
Permetriin imendub rinnapiima. Kuid võttes arvesse, et ravimit kasutatakse väikeses annuses, lühikest aega ja ainult lokaalselt, satub ravimit rinnapiima ainult väga väikeses annuses, mistõttu on vähetõenäoline, et see võiks mõjutada rinnapiima saavat last.
Vältida tuleb imiku kokkupuudet ema nahale kantud ravimiga. Imetav ema peab jälgima, et ravimit ei satuks rindadele.

**Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Ei ole teada, et permetriin mõjutaks auto juhtimise või masinatega töötamise võimet.

## 3. Kuidas permetriini kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Permetriinikasutatakse ainult välispidiselt.

**Kui te kasutate permetriini rohkem kui ette nähtud**

Kui te olete ravimit liiga palju nahale kandnud, peske või pühkige üleliigne ravim nahalt ära. Kui tekib nahaärritus, pöörduge arsti poole.
Kui ravim on satub silma, tuleb silmi rohke veega loputada.

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või keegi teine on permetriinialla neelanud. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

**Kui te unustate permetriini kasutada**

Kasutage unustatud annus niipea kui võimalik.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

## 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Permetriin võib põhjustada naha sügelemist, torkimis- või kõrvetustunnet (paresteesia), naha kuivust, löövet. Üksikjuhtudel on kirjeldatud naha muutumist tundetuks, turset, naha pigmentatsiooni muutusi. On teatatud väga harvadest juuste väljalangemise juhtudest.
Kõrvaltoimete tekkimise korral tuleb ravimi kasutamine lõpetada ja võtta ühendust arstiga.

**Kõrvaltoimetest teavitamine**
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## 5. Kuidas permetriini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## 6. Muu teave

**Müügiloa hoidja**

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

**Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2025.**