PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Prasikvanteel, 600 mg tahke suukaudne ravimvorm

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on prasikvanteel ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne prasikvanteeli võtmist
3. Kuidas prasikvanteeli võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas prasikvanteeli säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on prasikvanteel ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine prasikvanteel on parasiidivastane ravim, mida kasutatakse skisostomiaasi, teniaasi, tsüstiserkoosi, difüllobotriaasi ja muude paelusshaiguste raviks.

2. Mida on vaja teada enne prasikvanteeli võtmist

Ärge võtke prasikvanteeli**:**

- kui olete prasikvanteeli või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline
- kui teil on silma tsüstiserkoos. Parasiidi hävimine silmas võib põhjustada tõsise silmakahjustuse
- kui võtate rifampitsiini. Rifampitsiin vähendab prasikvanteeli taset veres ja seetõttu ei pruugi saavutada efektiivset taset

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne prasikvanteeli võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kui teil on maksahaigus
- kui teil on südamehaigus, seal hulgas südame rütmihäire
- kui teil on epilepsia või kannatate krampide käes
- kui teil on aju parasiitinfektsioon.

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei ole soovitatav kasutada alla 4-aastastel lastel (või alla 94cm pikkadel lastel), sest puudub ohutusteave.

Muud ravimid ja prasikvanteel

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriline ettevaatus on vajalik, kui prasikvanteeli kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:
- Rifampitsiin (tuberkuloosiravim) – koos kasutamine ei ole soovitatav
- Karbamasepiin, fenütoiin, fenobarbitaal (epilepsiaravim) – koos kasutamine ei ole soovitatav
- Deksametasoon (steroidhormoon) – koos kasutamine ei ole soovitatav
- Tsimetidiin (kasutatakse maohaavandite raviks)
- Ketokonasool, itakonasool (kasutatakse seeninfektsiooni raviks)
- Erütromütsiin (kasutatakse nakkuste raviks)
- Klorokviin (kasutatakse malaaria ennetuseks ja raviks)
- Efavirens (HIV ravim)

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos prasikvanteeliga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

Prasikvanteeli võtmine koos toidu, joogi ja alkoholiga
Eelistatult võtta prasikvanteeli koos toiduga - toidukorra ajal või järgselt. Prasikvanteeli kasutamisega samal päeval mitte juua greibimahla.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Imetamine prasikvanteeli võtmise päeval ning sellele järgneval 3 päeval ei ole soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Prasikvanteeli võtmise päeval on vajalik ettevaatus autojuhtimisel ning masinatega töötamisel, sest prasikvanteel võib põhjustada pearinglust, unisust ja krampe.

3. Kuidas prasikvanteeli võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate prasikvanteeli rohkem kui ette nähtud

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või keegi teine on võtnud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

Kui te unustate prasikvanteeli võtta

Võtke unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate prasikvanteeli võtmise

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõnedel inimestel tekib prasikvanteeli tarvitades allergiline reaktsioon, kuid tõsised allergilised reaktsioonid on väga harvad. Kui teil tekivad järgnevad sümptomid, võtke viivitamatult ühendust arstiga:
- Järsku tekkinud vilisev hingamine, hingamisraskus või pitsitustunne rinnus
- Silmalaugude, näo või huulte turse
- Üle keha esinev sügelus ja punetus või punetavad ja sügelevad laigud
- Nahalööve
- Rasked nahareaktsioonid, mis põhjustavad näiteks ville (võivad esineda ka suus ja keelel)

Prasikvanteel võib põhjustada ka järgmisi kõrvaltoimeid:
Väga sagedased (rohkem kui 1 kasutajal 10st):
- Peavalu
- Pearinglus
- Ebamugavustunne kõhus, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine
- Urtikaaria
- Kurnatus

Sagedased (esinevad 1-10 kasutajal 100st)
- Vertiigo (pöörlemistunne ja tasakaaluhäired)
- Unisus
- Söögiisu kadu
- Kõhulahtisus
- Lihasvalu
- Halb enesetunne
- Palavik

Harvad (esinevad 1-10 kasutajal 10000st)
- Maksa transaminaaside tõus veres

Väga harvad (esinevad 1-10 kasutajal 100000st)
- Allergilised reaktsioonid
- Eosinofiilide arvu suurenemine
- Seroosmembraanide põletik
- Krambihood
- Südame rütmihäired
- Verine kõhulahtisus

Kõrvaltoimetest teatamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas prasikvanteeli säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Säilitamise kohta vt infot pakendilt

6. Muu teave

Abiained vt pakendilt.

Müügiloa hoidja

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel.

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2025