PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Bromofenak, 0,9 mg/ml, silmatilgad, lahus

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on bromofenak ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne bromofenaki kasutamist
3. Kuidas bromofenakki kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas bromofenakki säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on bromofenak ja milleks seda kasutatakse

Bromofenak kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-d) ravimite rühma. Ravim blokeerib põletiku põhjustamisel osalevad teatud ained.

Bromofenakki kasutatakse täiskasvanud patsientidel katarakti operatsiooni järgse silmapõletiku vähendamiseks.

2. Mida on vaja teada enne bromofenaki kasutamist

Ärge kasutage bromofenakki
- kui te olete bromofenaki või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui teil on teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamise järel esinenud astmahoogusid, nahaallergiat või intensiivset põletikku ninas. Mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite hulka kuuluvad näiteks atsetüülsalitsüülhape (aspiriin), ibuprofeen, ketoprofeen, diklofenak.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Bromofenaki kasutamine võib põhjustada keratiiti ehk sarvkesta põletikku, raskeid sarvkesta kahjustusi, sealhulgas sarvkesta õhenemist, erosioone, perforatsiooni, haavandumist, mis võib kaasa tuua nägemise kahjustuse. Sarvkesta kahjustuse tekkimise korral tuleb ravimi kasutamine lõpetada.

Enne selle ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.
- kui kasutate paikseid steroide (nt kortisoon), sest see võib põhjustada soovimatuid kõrvaltoimeid;

- kui teil on veritsusprobleeme (nt hemofiilia) või on teil neid varem olnud või te kasutate teisi ravimeid, mis võivad pikendada veritsusaega (nt varfariin, klopidogreel, atsetüülsalitsüülhape);
- kui teil on silmaprobleeme (nt kuiva silma sündroom, sarvkesta probleemid);
- kui teil on suhkurtõbi;
- kui teil on reumatoidartriit;
- kui teil on lühikese aja jooksul tehtud korduvalt silmaoperatsioone.

Kaeoperatsiooni järgselt ei ole kontaktläätsede kandmine soovitatav. Seetõttu ärge kandke kontaktläätsi bromofenaki kasutamise ajal.

Lapsed ja noorukid

Lastel ja noorukitel ei tohi bromofenakki kasutada.

Muud ravimid ja bromofenak
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mingeid muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne bromofenaki kasutamist nõu oma arstiga.
Bromofenakki ei tohi kasutada kolme viimase raseduskuu jooksul. Arst võib määrata selle ravimi raseduse ajal kui eeldatav kasu emale ületab võimaliku kahju lapsele.
Bromofenakki võib määrata imetavale naisele ning tal puudub oluline toime viljakusele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Silmatilkade kasutamise järgselt võib lühiajaliselt esineda nägemise hägustumist. Kui teil tekkis manustamise järel nägemise hägustumine, siis hoiduge autojuhtimisest ja masinate kasutamisest kuni nägemise taastumiseni.

Bromofenak võib abiainetena sisaldada naatriumsulfitit ning bensalkooniumkloriidi
Täpset abiainete sisaldust vt. pakendilt
Naatriumsulfit võib põhjustada allergilisi reaktsioone või astmahooge, mis võivad mõnikord olla rasked ja eluohtlikud.
Bensalkooniumkloriid on konservant, mis võib põhjustada silma ärritust või probleeme silma pinnal. Ärge kasutage bromofenakki kontaktläätsede kandmise ajal, sest bensalkooniumkloriid muudab nende värvust.

3. Kuidas bromofenakki kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annus

Soovitatav annus on üks tilk bromofenakki haige(te)sse silma(desse) kaks korda ööpäevas (hommikul ja õhtul). Ärge kasutage ravimit rohkem kui üks tilk haige(te)sse silma(de)sse 2 korda ööpäevas.
Alustage nende tilkade kasutamist järgmisel päeval pärast katarakti operatsiooni.

Manustamisviis

Bromofenak on okulaarseks kasutamiseks.

- Enne silmatilkade kasutamist peske käed.

- Leidke endale mugav ja kindel asend.
- Eemaldage pudelikork keerates.
- Hoidke pudelit allapoole suunatuna pöidla ja sõrmede vahel.
- Kallutage pea tahapoole.
- Tõmmake puhta sõrmega alumist silmalaugu allapoole.
- Viige pudeli ots silmale lähedale.
- Ärge puudutage pipetiga silma, silmalaugu, silmaümbrust ega muid pindu.
- Pigistage pudelit õrnalt ühe tilga Bromofenaki manustamiseks.
- Sulgege pudelikork tihedalt kohe pärast kasutamist.
- Hoidke pudelit kasutamisvälisel ajal tihedalt suletuna.

Kui kasutate mingeid muid silmatilkasid, jätke vähemalt viis minutit bromofenaki ja teiste silmatilkade kasutamise vahele.

Ravi kestvus
Kasutage tilkasid esimese kahe operatsioonijärgse nädala jooksul. Ärge kasutage bromofenakki rohkem kui 2 nädalat.

Kui te kasutate bromofenakki rohkem kui ette nähtud
Loputage ravim silmast sooja veega välja. Ärge pange silma ühtegi tilka ravimit enne järgmist plaanilist manustamiskorda. Bromofenaki juhuslikul allaneelamisel tuleb juua vett või muud vedelikku ravimi lahjendamiseks.

Kui te unustate bromofenakki kasutada
Kui üks ravimi annus jääb vahele, pange see silma niipea kui meenub. Juhul, kui järgmise annuse kasutamise aeg on peaaegu käes, siis jätke ununenud annus kasutamata. Jätkake ravi järgmise planeeritud annusega. Ärge kasutage kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate bromofenaki kasutamise
Ärge lõpetage bromofenaki kasutamist ilma arstiga nõu pidamata.

Kaeoperatsiooni järgselt on bromofenaki ärajätmisel harva täheldatud põletikureaktsiooni ägenemist, näiteks võrkkesta turset.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kui teil esineb langenud nägemisteravust või hägusat nägemist üks nädal pärast ravi lõppu, peaksite pöörduma kohe oma arsti poole.

Kui märkate silmatilkade kasutamise ajal ükskõik missuguseid kõrvaltoimeid, pöörduge viivitamata oma arsti poole.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad kuni ühel kasutajal 100st)
Võõrkeha tunne silmas, silma punetus ja põletik, silma pinna kahjustus ja põletik, eritis silmast, sügelemine, silma ärritus või valu, silmalau turse või veritsus, põletikust tingitud nägemishäire, hõljuvad osakesed või liikuvad täpid silmade ees või nägemise halvenemine, mis võib viidata silma tagaosa (võrkkesta) veritsusele või kahjustusele; ebamugavustunne silmas, valgustundlikkus, nägemisteravuse vähenemine või hägune nägemine, näo turse, köha, ninaverejooks või nohu.

H**arva esinevad kõrvaltoimed (esinevad kuni ühel kasutajal 1000st)**
Silma pinna kahjustus, silma punetus, astma.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas bromofenakki säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelile ja karbile pärast märgist „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Nakkuse vältimiseks visake pudel ära 4 nädalat pärast esmakordset avamist isegi siis, kui pudelis on veel lahust.
Kirjutage karbile pudeli avamise kuupäev.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Säilitamise kohta täpsemat infot vt pakendilt

6. Muu teave

Abiained vt pakendilt.

Müügiloa hoidja

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel.

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2025