PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Vinkristiin, Parenteraalne ravimvorm 1 mg/ml

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on vinkristiin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne vinkristiini kasutamist
3. Kuidas vinkristiini manustatakse
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas vinkristiini säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on vinkristiin ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine vinkristiin on ravim, mida kasutatakse kasvajate raviks. Seda kasutatakse leukeemia, lümfoomi, hulgimüeloomi, rinna kartsinoomi, väikerakulise bronhogeense kartsinoomi, pea ja kaela kartsinoomi, ning pehmekoe sarkoomi raviks.

2. Mida on vaja teada enne vinkristiini kasutamist

Vinkristiini ei tohi kasutada:

- kui olete vinkristiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline
- kui teil on Charcot-Marie-Tooth sündroom (nõrkus säärelihastes)
- kui teil on infektsioon, mida ei ravita

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne vinkristiinravi pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- et olla kindel, et seda ravimit manustatakse ainult intravenoosse süste või infusioonina, seda ravimit ei peaks manustama muid teid pidi. Kui teil esineb valu ravimi manustamise ajal või vahetult pärast seda, rääkige sellest viivitamatult õe või arstiga.
- kui teil on psühhiaatriline või närvisüsteemi haigus
- kui olete saanud või saamas kiiritusravi
- kui teil on infektsioon
- kui teil on madal valgete vereliblede tase vereanalüüsil
- kui teil on neeruhaigus
- kui teil on maksahaigus
- kui te olete eakas
- kui teil on probleeme hingamisega. Vinka alkaloididega (vinkristiin kuulub sellesse ravimgruppi) seoses on teateid ägedast õhupuudusest ja raskest bronhospasmist.
- et vältida kontakti silmadega. Kui vinkristiin peaks silma sattuma, rääkige sellest viivitamatult õele või arstile.

Muud ravimid ja vinkristiin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriline ettevaatus on vajalik, kui vinkristiini kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:
- Allopurinool (kasutatakse podagra raviks)
- Püridoksiin (vitamiin B6)
- Isoniasiid (kasutatakse tuberkuloosi ravis)
- Seenevastased ravimid (asoolid, näiteks itrakonasool, posakonasool, flukonasool, isavukonasool, vorikonasool)
- Ketokonasool (kasutatakse seenevastase ravimine ja Cushingi tõve ravis (ülemäärase kortisooli taseme korral))
- L-asparginaas (kasutatakse kasvajate ravis)
- Daktinomütsiin (kasutatakse kasvajate ravis)
- Kasvajate ravimid, mis võivad põhjustada kuulmis- või tasakaaluprobleeme (näiteks plaatina sisaldavad ravimid)
- Ravimid, mis võivad tekitada urineerimisraskuseid. Nende kasutamine tuleks lõpetada enne vinkristiini kasutamise alustamist.
- Ravimid, mis võivad põhjustada närvisüsteemi probleeme, näiteks kõndimisraskuseid, paresteesiaid või tundehäired.
- Elusvaktsiinid. Vinkristiin alandab keha immuunsust ja elusvaktsiinid võivad põhjustada tõsist haigust. Pidage nõu arstiga, kui kaua tuleks enne elusvaktsiinide manustamist oodata.
- Ravimid, mida kasutatakse madala valgete vereliblede hulga raviks (granulotsüütide kolooniat stimuleerivad faktorid (G-CSF)). Nende kasutamine samaaegselt vinkristiiniga võib vähendada luuüdis vererakkude tootmist (müelosupressioon).
- Fenütoiini (kasutatakse epilepsia ravis) võib vinkristiiniga koos kasutades väheneda, seega tuleks fenütoiini taset veres jälgida.
- Metotreksaadi toime vähiravimine võib tugevneda, kui kasutatakse vinkristiiniga samaaegselt.
- Naistepuna preparaadid

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib vinkristiinravi ajal kasutada. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Reproduktiivses eas naised peaksid ravi ajal ja vähemalt 7 kuud pärast vinkristiini viimast doosi kasutama sobivaid rasestumisvastaseid vahendeid.

Meestel soovitatakse ravi ajal ja vähemalt 4 kuud pärast viimast vinkristiini doosi kasutada sobivaid rasestumisvastaseid vahendeid.

Kuna on võimalik, et lapsel tekivad imetamise ajal tõsised reaktsioonid vinkristiinile, soovitatakse vinkristiiniga ravi ajal ning sellele järgnevalt 1 kuu jooksul mitte imetada.

Ravi vinkristiiniga võib mõjutada teie viljakust. Meestel ja naistel, kes soovivad pärast ravi lapsi saada, on soovitatav arutada arstiga võimalusi viljakuse säilitamiseks.

Pidage nõu arstiga teile ja teie partnerile sobivate rasestumisvastaste vahendite osas.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot või töötage masinatega, kui teil esineb kõrvaltoimeid, mis seda segavad.

3. Kuidas vinkristiini manustatakse

Teile manustatava ravimi doos oleneb terviseseisundist, keha pindalast ja maksafunktsioonist. Tavaline doos on 1,4-1,5mg/m2 kohta täiskasvanutel ja 1,4-2 mg/m2 kohta (maksimaalne doos 2mg nädalas) lastel. Alla 10 kg kaaluvatel lastel on algne doos 0,05mg/kg nädalas. Doosi on soovitatav vähendada maksapuudulikkusega patsientidel.

Vinkristiini manustatakse ainult veenikaudse süste või infusioonina. Tavaliselt manustatakse ravimit nädalase intervalliga.

Kui teile manustatakse vinkristiini rohkem või vähem kui ette nähtud

Kuna tegemist on ravimiga, mida manustatakse haiglas, on ala- või üleannus ebatõenäoline, kuid pidage nõu arsti või õega, kui teil on selles osas kahtlus.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mõni järgnevatest sümptomitest, teavitage viivitamatult arsti:
- tõsine allergiline reaktsioon: Teil võib tekkida äkiline sügelev lööve (nõgestõbi), käte, jalgade, pahkluude, näo, huulte, suu või kurgu turse (mis võib põhjustada neelamis- või hingamisraskusi), ja võite tunda, et minestate.
- Valu või turse süstekohal süstimise ajal või vahetult pärast seda.
- Tugevad valu rinnus, mis võivad kiirguda lõualuusse või kätte, higistamine, hingeldus ja iiveldus.
- Tõsised hingamisprobleemid või õhupuudus.
- Sepsisele viitavad sümptomid: nendeks võivad olla kõrge palavik või madal kehatemperatuur, värisemine, kiire südametegevus, kiirenenud hingamine, minestustunne, naha muutused (külm, niiske, kirjude laikudena või kahvatu), muutunud vaimne seisund, nagu segasus või desorientatsioon, vähenenud urineerimine, iiveldus, oksendamine jne. Mitme sellise sümptomi esinemine koos üldise seisundi kiire halvenemisega võib viidata sepsisele ja vajab kohest arstiabi.

Need on tõsised kõrvaltoimed ja teil võib olla vaja kiiret meditsiinilist sekkumist.

Vinkristiin võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid
Väga sagedased kõrvaltoimed (enam kui 1/10st ravimit saanud patsiendil)
- Trombotsüütide hulga vähenemine, mis suurendab verejooksu riski
- Punaste vereliblede hulga vähenemine, mis võib põhjustada kahvatust ja väsimust
- Isutus
- Tundlikkushäired, sipelgate jooksmise tunne
- Kõhukinnisus, kõhukrambid
- Iiveldus, oksendamine
- Juust väljalangemine
- Lihasnõrkus või lihaste kõhetumine
- Luuvalu
- Kaalulangus

Sagedased kõrvaltoimed (kuni 1/10st)
- Valu lõuas või kurgus
- Kõhulahtisus
- Probleemid urineerimisega (enam või vähem uriini kui tavaliselt või valu urineerimisel)

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (kuni 1/100st)
- Kooma

Teadmata sagedusega esinevad kõrvaltoimed (olemasolevate andmete põhjal ei saa sagedust hinnata)
- Infektsioonid
- Palavik, kurguvalu, nahalööbed või haavandid kehal ja suus (mis võivad viidata valgete vereliblede arvu vähenemisele)
- Verevalumid
- Kõrgenenud kusihappe tase veres
- Halvatus
- Krambid
- Pearinglus
- Reflekside kadu
- Aju talitlushäired
- Peavalu
- Kõndimisraskused
- Kõnehäired
- Ebatavalised silmaliigutused
- Nägemise halvenemine
- Kurtus või kuulmislangus
- Naastude teke arterites
- Kõrgenenud või alanenud vererõhk
- Kerged hingamisprobleemid
- Väsimus
- Maksaprobleemid
- Seljavalu
- Põieprobleemid
- Süstekoha valulikkus

Vinkristiin võib põhjustada muutusi teie vererakkudes, sealhulgas hemolüütilist aneemiat, kus punaseid vereliblesid hävitatakse. Teie arst võib võtta vereproove, et neid muutusi jälgida ning kontrollida maksa talitlust.

On teatatud ka teistest pahaloomulistest kasvajatest, mis on tekkinud hiljem pärast vinkristiini kasutamist koos teiste vähiravimitega. Seda juhtub harva.

Kõrvaltoimetest teatamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas vinkristiini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Säilitamise kohta vt infot pakendilt

6. Muu teave

Abiained vt pakendilt.

Müügiloa hoidja

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel.

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2025.