PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Kloortetratsükliin 10 mg/g silmasalv

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on kloortetratsükliini silmasalv ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne kloortetratsükliini silmasalvi kasutamist
3. Kuidas kloortetratsükliini silmasalvi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas kloortetratsükliini silmasalvi säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on kloortetratsükliini silmasalv ja milleks seda kasutatakse

Kloortetratsükliin kuulub antibakteriaalsete ravimite rühma.

Silmasalvi kasutatakse kloortetratsükliinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud silmapõletike raviks.

2. Mida on vaja teada enne kloortetratsükliini silmasalvi kasutamist

Kloortetratsükliini silmasalvi ei tohi kasutada
– kui olete kloortetratsükliini, tetratsükliinide või selle ravimi mis tahes koostisosade (vt pakendilt) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne kloortetratsükliini silmasalvi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Antibiootikumide kasutamine võib mõnikord põhjustada mittetundlike mikroorganismide põhjustatud sekundaarseid infektsioone.
- Kui ravi ajal tekivad uued infektsioonid, lõpetage ravi ja teavitage oma arsti.
- Tõsiste kõrvaltoimete või ülitundlikkuse korral lõpetage ravi ja võtke ühendust arstiga.

Ärge kandke kontaktläätsi ravi ajal kloortetratsükliini silmasalviga.

Lapsed ja noorukid
- Tetratsükliinide suukaudne manustamine lastele avaldab kahjulikku mõju hammaste moodustumisele (värvimuutus, ebapiisav emaili moodustumine). Kuigi seda ei ole täheldatud silmaravimite kasutamisel, tuleb alla 8-aastastel lastel olla ettevaatlik. Enne kloortetratsükliini silmasalvi kasutamist lapsel pidage alati nõu arstiga.

Muud ravimid ja kloortetratsükliini silmasalv

Kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta lisaks kloortetratsükliinile mingeid muid ravimeid, teavitage sellest oma arsti või apteekrit.

Teiste ravimitega koostoimeid ei ole teada.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Iga silmasalv võib vahetult pärast kasutamist põhjustada ajutisi nägemishäireid. Seetõttu tuleb mootorsõidukite juhtimisel, kindla toeta kohas töötamisel ja masinatega töötamisel olla eriti ettevaatlik.

Silmasalv sisaldab lanoliini (vt pakendilt).
See koostisosa võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti).

3. Kuidas kloortetratsükliini silmasalvi kasutada

Manustamisviis
Okulaarseks (silmas) kasutamiseks.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kui paranemist ei toimu, pidage uuesti nõu oma arstiga.

Kloortetratsükliin on ravim välispidiseks kasutamiseks, mida tuleb kanda silma.
Kandke iga kahe tunni järel umbes 1 cm pikkune salviriba alumisse konjunktiivikotti. Rasked infektsioonid võivad vajada pikaajalist ravi, mõnikord koos suukaudsete antibiootikumidega.

Arst ütleb teile, kui kaua kloortetratsükliini silmasalvi kasutada. Ärge lõpetage ravi enneaegselt, sest sümptomid võivad taastuda, kui kõik bakterid ei ole hävinud.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Sama nagu täiskasvanutel.

Kui te kasutate kloortetratsükliini silmasalvi rohkem, kui ette nähtud
Kloortetratsükliini silmasalvi üleannustamise juhtudest ei ole teatatud.
Kui olete kasutanud või ekslikult võtnud liiga palju silmasalvi, võtke viivitamatult ühendust oma arsti, apteekri või mürgistusteabekeskusega.

Kui te unustate kloortetratsükliini silmasalvi manustada
Te peate järgima arsti poolt soovitatud ravikuuri kestust, sest sümptomid võivad taastekkida, kui kõiki baktereid ei hävitata.
Kui soovite ravi varem lõpetada, pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Silmadega seotud kõrvaltoimed:
- suurenenud pisaravool
- ajutine võõrkehatunne
- ärritus- või põletustunne silmades
- ajutine nägemishäire.

Naha ja nahaaluskoe kõrvaltoimed:
- allergiline reaktsioon (ülitundlikkus)
- nahapõletik (punetus) (dermatiit).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimetest teatamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas kloortetratsükliini silmasalvi säilitada

Säilitamise kohta vt infot pakendilt

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Tarvitada ära 4 nädala jooksul pärast esmast avamist.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Abiained vt pakendilt.

Müügiloa hoidja

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel.

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2025.