PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Atsikloviir 30 mg/g silmasalv

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on atsikloviir silmasalv ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne atsikloviir silmasalvi kasutamist
3. Kuidas atsikloviiri silmasalvi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas atsikloviiri silmasalvi säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on atsikloviir silmasalv ja milleks seda kasutatakse

Atsikloviir kuulub viirusvastaste ravimite rühma.

Atsikloviiri silmasalvi kasutatakse täiskasvanutel *herpes simplex* viiruse poolt põhjustatud silmapõletiku raviks. Selle toimeks on viiruste arengu peatamine või hävitamine silmamuna esiküljel (sarvkestal).

2. Mida on vaja teada enne atsikloviir silmasalvi kasutamist

Atsikloviir silmasalvi ei tohi kasutada
- kui olete atsikloviiri, valatsikloviiri või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne atsikloviiri silmasalvi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Kasutage atsikloviiri silmasalvi ainult silma peal.
- Pärast manustamist võib teil kohe tekkida kerge kipitus- ja põletustunne.
- Kui teil tekivad kohesed allergilised reaktsioonid, nagu kiiresti tekkiv nahaalune turse sellistes kohtades nagu nägu, kõri, käed ja jalad (angioödeem) jne, pöörduge kohe arsti poole.
- Kui teil tekivad allergilised reaktsioonid, nagu silmalau sügelus, silma turse või punetus, katkestage ravi atsikloviiri silmasalviga ja konsulteerige arstiga.
- Palun võtke kohe ühendust oma arstiga nõu saamiseks, kui mõni sümptom muutub tõsiseks või kordub.

Ärge kandke ravi ajal atsikloviir silmasalviga kontaktläätsi.

Lapsed ja noorukid
Sama nagu täiskasvanutel.

Muud ravimid ja atsikloviiri silmasalv
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.
Paiksel silma manustamisel ei ole seni täheldatud märkimisväärseid koostoimeid.

Siiski ei ole piisavalt teavet atsikloviiri silmasalvi kasutamise ja samaaegselt kortikosteroide sisaldavate silmaravimite kasutamise kohta. Teie arst otsustab, kas see sobib teile.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Atsikloviiri silmasalvi võib kasutada raseduse või imetamise ajal, kuna ettenähtud annustes kasutamisel ei ole oodata kõrvaltoimeid rasedusele, lootele või vastsündinud lapsele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Oma olemuse tõttu võib see ravim põhjustada ajutisi nägemishäireid. Seetõttu tuleb mootorsõidukite juhtimisel, kindla toeta kohas töötamisel ja masinatega töötamisel olla eriti ettevaatlik.

3. Kuidas atsikloviiri silmasalvi kasutada

Manustamisviis
Okulaarseks kasutamiseks.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arst ei ole teisiti määranud, on soovitatav annus:
5 korda päevas (iga 4 tunni tagant) pigistage 1 cm pikkune salviriba alumisse konjunktiivikotti. Soovitatavad kellaajad on: **7:00, 11:00, 15:00, 19:00 ja 23:00.**
Tõmmake alumine silmalaug alla ja pigistage salviriba konjunktiivikotti. Sulgege silmalaud ja pööritage oma silmamunasid nii, et salv jaotuks paremini.
On oluline, et te manustaksite atsikloviiri silmasalvi päeva jooksul regulaarselt 4 tunniste vahedega, et tagada ravi edukus. Kui sarvkesta põletik on paranenud, jätkake ravi vähemalt 3 päeva.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Sama nagu täiskasvanutel.

Kui te kasutate atsikloviiri silmasalvi rohkem, kui ette nähtud
Pöörduge oma arsti või apteekri poole, kui te kasutate liiga suures koguses atsikloviiri silmasalvi.
Atsikloviir on mõeldud silmas kasutamiseks, kui olete ravimit alla neelanud, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kui te unustate atsikloviiri silmasalvi manustada
Kui te unustate atsikloviiri silmasalvi kasutada, manustage unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on aga juba peaaegu aeg manustada järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui te lõpetate atsikloviiri silmasalvi kasutamise
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Vahetult pärast silmasalvi manustamist võib tekkida mööduv kerge kipitus- või põletustunne. Kui te märkate näo turset, angioödeemi jne, lõpetage atsikloviiri kasutamine ja pöörduge kohe arsti poole.

Väga harvad esinevad (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st) **allergilised reaktsioonid.**

Kui teil tekib allergiline reaktsioon või äge ülitundlikkusreaktsioon, lõpetage atsikloviiri kasutamine ja pöörduge kohe arsti poole.
Nähud võivad olla järgmised:

- nahalööve, sügelus või nõgestõbi;
- näo, huulte, keele või teiste kehaosade turse;
- õhupuudus, vilistav hingamine või hingamisraskused;
- seletamatu palavik (kõrge temperatuur) ja minestamistunne, eriti püsti tõustes.

Muud kõrvaltoimed.

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):
põletustunne või ärritus, fotofoobia/valgustundlikkus või tunne, nagu oleks midagi silmas (pindmine punktkeratopaatia).
See ei nõua tavaliselt ravi lõpetamist ja paraneb kohe.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):
mööduv kerge kipitus- või põletustunne kohe pärast manustamist;
paistes, vesised silmad (konjunktiviit).

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st):
paistes, punased, ärritunud, sügelevad silmalaud (blefariit).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimetest teatamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas atsikloviiri silmasalvi säilitada

Säilitamise kohta vt infot pakendilt

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Tarvitada ära 4 nädala jooksul pärast esmast avamist.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Abiained vt pakendilt.

Müügiloa hoidja

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel.

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2025.