PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Deksametasoon + neomütsiin + jää-äädikhape, 0,1%+0,5%+2%, kõrvasprei

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord
1. Mis ravim on Deksametasoon + neomütsiin + jää-äädikhape kõrvasprei ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Deksametasoon + neomütsiin + jää-äädikhape kõrvasprei kasutamist
3. Kuidas Deksametasoon + neomütsiin + jää-äädikhape kõrvaspreid kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Deksametasoon + neomütsiin + jää-äädikhape kõrvaspreid säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on Deksametasoon + neomütsiin + jää-äädikhape kõrvasprei ja milleks seda kasutatakse

Ravim sisaldab toimeainetena deksametasooni, neomütsiini ja jää-äädikhapet. Deksametasoon on paikselt kasutatav kortikosteroid (hormoon), mida kasutatakse põletikuliste protsesside pärssimiseks. Neomütsiin on laia toimespektriga antibiootikum (bakterite vastane aine). Jää-äädikhape on antibakteriaalse toimega aine, mis aitab piirkonda desinfitseerida.
Ravimit kasutatakse kõrva väliskuulmekäigu põletikuliste haiguste raviks.

2. Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Deksametasoon + neomütsiin + jää-äädikhape kõrvaspreid:

- kui olete deksametasooni, neomütsiini või jää-äädikhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline
- kusagil mujal kui kõrvas, st ärge manustage seda ravimit suhu või ninna, vältige selle ravimi sattumist silma.
- kui teil on kõrva trummikile perforatsioon (trummikile katki) või trummikile šunteeritud
- alla 2-aastastel lastel

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

<u>Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:</u>
- kui teil on (või arvate, et on) mitokondriaalne haigus (mutatsioonid teie rakkude osades, mis aitavad toota energiat); teatud mitokondriaalsed haigused võivad selle ravimi kasutamisel suurendada kuulmislanguse riski.
- kui teil on kõrva vigastus. Selle ravimi kasutamine (eriti suurtes kogustes ja pikaajaliselt) vigastatud nahaga kõrvas võib põhjustada kuulmise kaotust. Eriti oluline on seda silmas pidada laste puhul.

- seda ravimit ei tohi alla neelata. Kui keegi (eriti laps) on seda ravimit alla neelanud, siis pöörduge koheselt arsti poole.

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei tohi kasutada alla 2-aastastel lastel.
Suuremate laste puhul on selle ravimi kasutamisel vajalik eriline ettevaatus.

Muud ravimid ja Deksametasoon + neomütsiin + jää-äädikhape kõrvasprei

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Koostoimetest teiste ravimitega ei ole teatatud.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole teada, et selle ravimi kasutamine mõjutaks auto juhtimise või masinatega töötamise võimet.

3. Kuidas Deksametasoon + neomütsiin + jää-äädikhape kõrvaspreid kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi esmakordsel kasutamisel:

Loksutage pudelit enne ravimi kasutamist
Teadke, et enne esmakordset kasutamist peate tõenäoliselt vajutama pumbale mitu korda enne, kui sellest ravimit pihustub.
Enne pumbale vajutamist veenduge, et pihusti otsik ei oleks suunatud teie või kellegi teise suunas.
Igakordsel pumbale vajutamisel vabaneb pudelist üks annus ravimit.

Kui te pole ravimit rohkem kui nädala jooksul kasutanud, tuleb teil tõenäoliselt jälle mitu korda pumbale vajutada enne, kui sellest ravimit pihustub.

Kõrvasprei on ainult välispidiseks kasutamiseks.

Ravimi kasutamine täiskasvanul ja üle 2-aastasel lapsel:
Ravimit manustama asudes loksutage esmalt pudelit.
Asetage pihusti otsik õrnalt haige kõrva väliskuulmekäigu juurde.
Vajutage pumbale ja pihustage üks annus ravimit väliskuulmekäiku.

Annustamine:
Tavaline annus on: 1 annus (1 vajutus pumbale) 3 korda päevas.
Kasutage ravimit seni, kuni 2 päeva on möödunud haiguse sümptomite kadumisest.
Kui teie haigus pole paranenud või on süvenenud pärast 7 päevast ravimi kasutamist, lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge arsti poole.
Ärge ületage soovitatavat annust.

Kui te kasutate ravimit rohkem kui ette nähtud

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või keegi teine on manustanud liiga suure annuse või võtnud suu kaudu seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

Kui te unustate ravimit kasutada

Kasutage unustatud annus niipea kui võimalik ja jätkake seejärel ravimi kasutamist tavapärasel viisil. Kui on juba peaaegu aeg kasutada järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate ravimi kasutamise

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata. Kui te lõpetate selle ravimi kasutamise liiga vara, siis võib infektsioon uuesti süveneda.

Kasutage ravimit seni, kuni 2 päeva on möödunud haiguse sümptomite kadumisest.
Kui teie haigus pole paranenud või on süvenenud pärast 7 päevast ravimi kasutamist, siis lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge arsti poole

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage ravimi kasutamine kohe ja pöörduge arsti poole, kui teil tekib naha sügelemine, nahaärritus ja lööve piirkonnas, kuhu olete ravimit pihustanud (allergiline reaktsioon).

Ravim võib põhjustada ka järgmisi kõrvaltoimeid, kuid need on enamasti mööduvad:
Torkimis- ja kõrvetustunne piirkonnas, kuhu ravimit on manustatud.
Teatatud on ka nägemise ajutisest hägustumisest.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Deksametasoon + neomütsiin + jää-äädikhape kõrvaspreid säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Muu teave

Abiainete kohta vaata pakendilt.

Müügiloa hoidja

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel.

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2025.