PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Kromoglütsiinhape 40 mg/ml silmatilgad, lahus

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui sümptomid ei parane või pärast kahe päeva möödumist halvenevad, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on kromoglütsiinhape ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne kromoglütsiinhappe kasutamist
3. Kuidas kromoglütsiinhapet kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas kromoglütsiinhapet säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on kromoglütsiinhape ja milleks seda kasutatakse

Kromoglütsiinhape kuulub allergiavastaste ravimite rühma.
Kromoglütsiinhapet kasutatakse allergiast põhjustatud silmasümptomite raviks. Ravim takistab teie silmas leiduvate histamiini sarnaste ainete vabanemist, mis muidu vallandaksid allergilise reaktsiooni. Allergiliste reaktsioonide tunnuste hulka kuuluvad sügelevad, vesised, punetavad või põletikulised silmad ning silmalaugude paistetus. Tavaliselt esineb see mõlemas silmas.
Need nähud tekivad tavaliselt kevadel või suvel, kui rohu või puude õietolm satub silma inimestele, kes on selle suhtes tundlikud.
Kui sümptomid ei parane või pärast kahe päeva möödumist halvenevad, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne kromoglütsiinhappe kasutamist

Kromoglütsiinhapet ei tohi kasutada
kui olete kromoglütsiinhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne kromoglütsiinhappe kasutamist pidage nõu oma arstiga, kui need haigusnähud on tekkinud ainult ühes silmas, sest allergiline reaktsioon tekib tavaliselt mõlemasse silma korraga.

Alla 4-aastastel lastel lubatud kasutada ainult arsti ettekirjutuse järgi.

Muud ravimid ja kromoglütsiinhape
Kui kasutate samal ajal ka teisi silmatilkasid, tuleb neid manustada vähemalt 15-minutilise vahega.

Rasedus ja imetamine
Kõrvalmõjusid lootele ei ole teada. Raseduse ja imetamise ajal võib kromoglütsiinhapet kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Sarnaselt teistele silmatilkadele võib kromoglütsiinhape põhjustada lühiajalist nägemise hägustumist. Sel juhul ärge juhtige autot ega kasutage masinaid enne, kui nägemine on täielikult taastunud.

Kontaktläätsed
Küsi apteekrilt/vaata infot pakendilt, kas ravimit võib kasutada koos kontaktläätsedega.

3. Kuidas kromoglütsiinhapet kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infoleheles või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus üle 4-aastastele lastele ja täiskasvanutele on 1...2 tilka mõlemasse silma kaks korda päevas.

Alla 4-aastastel lastel kasutamine vaid arsti ettekirjutuse järgi.

Enne silmatilkade panekut:
- enne pudeli avamist peske käed
- pudeli esmakordsel avamisel tilgutage esimene tilk kasutamata välja. Lahuse saastumise vältimiseks ärge pudeli otsaga midagi puudutage.
- valige endale tilkade manustamiseks kõige mugavam asend (võite istuda, olla selili või seista peegli ees)

Kui teie sümptomid ei parane või pärast kromoglütsiinhappe kasutamist kahe päeva jooksul halvenevad, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Soovitatav on kasutada silmatilku regulaarselt iga päev kokkupuuteperioodil allergeeniga, nii hoiate sümptomite tekke ära.

Kui te kasutate kromoglütsiinhapet rohkem, kui ette nähtud
Kromoglütsiinhappe üleannustamisega kaasnevaid reaktsioone ei ole teada. Kui te kahtlustate, et üleannustamine võis põhjustada mittesoovitavaid toimeid, võtke ühendust arsti või apteekriga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Teatatud on allergilistest (ülitundlikkuse) reaktsioonidest. Nende sagedus ei ole siiski teada.
Kui teil tekivad sümptomid, nagu lööve, neelamis- või hingamishäired, huulte, näo, kõri, keele paistetus ja punetuse suurenemine, peate kohe arsti poole pöörduma.
Sage kõrvaltoime (võib tekkida kuni 1 inimesel 10-st) on silmade paikne kipitus.

Kõrvaltoimetest teatamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu.Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas kromoglütsiinhapet säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil pärast „EXP/Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Säilitamise kohta vt infot pakendilt.
Pudeli esmakordse avamise järel tohib ravimit kasutada teatud aja jooksul – vt. pakendilt. Avatud pudel tuleb hoida kindlalt suletuna.

6. Muu teave

Abiained vt. pakendilt.

Müügiloa hoidja ja tootja

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel.

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2025.