PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Etosuksimiid
Tahke suukaudne ravimvorm 250mg
Vedel suukaudne ravimvorm 50 mg/ml

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on etosuksimiid ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne etosuksimiidi võtmist
3. Kuidas etosuksimiidi võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas etosuksimiidi säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on etosuksimiid ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine etosuksimiid on epilepsiavastane ravim, mida kasutatakse absaanshoogude raviks.

2. Mida on vaja teada enne etosuksimiidi võtmist

Ärge võtke etosuksimiidi:

- kui olete etosuksimiidi, teiste suksimiidide või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne etosuksimiidi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kui teil on maksa- või neeruhaigus
- kui teil on alanenud luuüdi talitlus või trombotsüütide tase veres

Raskeid nahareaktsioone on kirjeldatud, seal hulgas Stevens-Johnsoni sündroomi ning ravimreaktsiooni eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS). Lõpetage kohe ravimi tarvitamine ja pöörduge arsti poole, kui märkate neljandas osas kirjeldatud sümptomeid.

Vähestel epilepsiavastasel ravil, seal hulgas etosuksimiid-, olevatel patsientidel on tekkinud enesetapumõtteid. Kui teil tekivad sellised mõtted, võtke kohe ühendust arstiga.

Pöörake erilist tähelepanu sümptomitele, mis võivad viidata keha alanenud vererakkude tootmisele (luuüdi supressioon), näiteks palavik, kurgu või tonsillide põletik, ja kergesti tekkivad verevalumid ja veritsus, ja konsulteerige nende tekkimisel arstiga.
Verd tuleb regulaarselt kontrollida (algselt iga kuu ja aasta möödudes iga kuue kuu järel).
Maksaensüümide taset tuleb samuti regulaarselt kontrollida.

Muud ravimid ja etosuksimiid

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriline ettevaatus on vajalik, kui etosuksimiidi kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:
Teised epilepsiavastased ravimid (fenütoiin, valproaat)
Isoniasiid (tuberkuloosiravim). Etosuksimiidi tase veres võib tõusta.
Kesknärvisüsteemi mõjutavad rahustid.

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos etosuksimiidiga**.** Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

Etosuksimiidi võtmine koos toidu, joogi ja alkoholiga

Ravimit võib võtta koos toiduga või tühja kõhuga.

Alkohol
Ärge jooge alkoholi selle ravimi kasutamise ajal, sest alkohol võib võimendada selle ravimi kõrvaltoimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.
Ravimit ei peaks kasutama rinnaga toitmise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Etosuksimiid võib muuta teid uniseks ja võib aeglustada teie reaktsioonikiirust, seetõttu võib see ravim kahjustada teie autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

3. Kuidas etosuksimiidi võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovituslik algdoos täiskasvanutele ja üle 6-aastastele lastele on 250 mg 2 korda ööpäevas; 3-6 aastastele lastele 250 mg 1 kord ööpäevas; ja alla 3-aastastele lastele 10 mg/kg kohta päevas jagatuna 1-2 annuseks.

Annust võidakse suurendada 125 mg kaupa 4-7 päeva tagant, kuni on saavutatud sobiv annus. Maksimaalne annus täiskasvanute ja üle 6-aastase laste jaoks on 1,5-2 grammi; alla 6-aastaste laste jaoks 1 gramm.

Kui te võtate etosuksimiidi rohkem kui ette nähtud

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või keegi teine on võtnud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

Kui te unustate etosuksimiidi võtta

Võtke unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate etosuksimiidi võtmise

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage etosuksimiidi kasutamine ja otsige koheselt meditsiinilist abi, kui märkate mõnda järgmistest sümptomitest:

- Punetavad laigud kehal, mis on sihtmärgi- või ringikujulised, mille keskel on sageli villid, nahakoorumise, suu, kurgu, nina, suguelundite ja silmade haavanditega. Need tõsised nahalööbed võivad eelnevalt olla seotud palaviku ja gripitaoliste sümptomitega (Stevens-Johnsoni sündroom)
- Ulatuslik lööve, kõrge kehatemperatuur ja suurenenud lümfisõlmed (ravimi reaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS)) (Sagedus teadmata). Kui need sümptomid on rasked ja te tunnete ka liigesevalu ja põletikku, võib see olla seotud seisundiga nimega süsteemne erütematoosluupus

Otsige meditsiinilist abi, kui märkate mõnda järgmistest sümptomitest:

- Vere muutused (sellele võivad viidata kergem verevalumite või verejooksude teke, palavik, kahvatus või tõsine kurguvalu, suu haavandid, väsimus, korduvad infektsioonid või infektsioonid, mis ei taandu). Need võivad olla esimesed märgid kõrvalekalletest, sealhulgas punaste vereliblede, valgete vereliblede või trombotsüütide arvu vähenemisest ja luuüdi pärssimisest.).
- Kui te kogete üldiste krampide (toonilis-klonilised krambid) arvu suurenemist

Teised võimalikud kõrvaltoimed:

- Väga sagedased kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st): söögiisu vähenemine, peavalud, tasakaaluhäired, liikumise kontrollimise raskused, peapööritus, uimasus, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, kerge nahalööve, sealhulgas leetrite sarnane reaktsioon, urtikaaria.
- Sagedased kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st): agressiivne käitumine, õudusunenäod, depressioon, enesetapumõtted, psühhootilised häired, unehäired, treemor, ebanormaalsed või koordineerimata liigutused, aeglus, keskendumisraskused, lühinägelikkus, luksumine, kõhulahtisus, suurenenud igemed, paistes keel, veri uriinis, tupeverejooks, väsimus, ärrituvus, kehakaalu langus, paranoia, üliaktiivsus, vereanalüüsides muutused, eriti eosinofiilide osas.
- Teadmata (sagedust ei saa olemasolevate andmete põhjal hinnata): suurenenud heaolu tunne, suurenenud seksuaalvajadus, rahutus, huvi kaotamine tegevuste vastu, krambid, lümfisõlmede suurenemine.

Kõrvaltoimetest teatamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas etosuksimiidi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Säilitamise kohta vt infot pakendilt

6. Muu teave

Abiained vt pakendilt.

Müügiloa hoidja

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel.

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2026.