PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Niklosamiid tahke suukaudne ravimvorm 500 mg

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on niklosamiid ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne niklosamiidi võtmist
3. Kuidas niklosamiidi võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas ravimit säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on niklosamiid ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine niklosamiid on ussnugiliste vastane ravim. Niklosamiidi kasutatakse teniaasi (laiuss), difüllobotrioosi, sparganoosi jt paelusshaiguste ravis.
Ravim hävitab ussnugilised kokkupuutel, tapetud ussnugilised erituvad seejärel väljaheitega.

2. Mida on vaja teada enne niklosamiidi võtmist

Ärge võtke niklosamiidi:

- kui olete niklosamiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

On oluline, et arst kontrolliks teie ravi efektiivsust regulaarsete visiitide ajal. See on vajalik selleks, et veenduda infektsiooni täielikus taandumises.
Kui teie sümptomid ei parane mõne päeva jooksul või süvenevad, pöörduge arsti poole.

Muud ravimid ja niklosamiid

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Niklosamiidi võtmine koos toidu, joogi ja alkoholiga

Ärge jooge alkoholi selle ravimi kasutamise ajal, sest alkohol võib võimendada selle ravimi kõrvaltoimeid. Tubakas võib samuti võimendada selle ravimi kõrvaltoimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Naistega läbi viidud uuringud näitavad, et see ravim kujutab rinnaga toitmise ajal imikule minimaalset ohtu.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Niklosamiid võib põhjustada pearinglust ja unisust ning aeglustada teie reaktsioonikiirust, seetõttu võib see ravim kahjustada teie autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

3. Kuidas niklosamiidi võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Nikoslamiidi võib võtta tühja kõhuga (kas 1 tund enne või 2 tundi pärast sööki). Maoärrituse vältimiseks on seda siiski kõige parem võtta pärast kerget einet (näiteks hommikusööki).

Nikoslamiidi tablette tuleb hoolikalt närida või purustada ja seejärel väikese koguse veega alla neelata. Kui seda ravimit antakse väikelapsele, tuleb tabletid peeneks pulbriks purustada ja väikese koguse veega segada, et moodustuks pasta.

Nakkuse täielikuks raviks võtke seda ravimit täpselt vastavalt arsti juhistele. Tavaliselt piisab ühest annusest. Mõnedel patsientidel võib infektsiooni täielikuks raviks siiski vaja minna teist annust.

Kui te võtate niklosamiidi rohkem kui ette nähtud

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või keegi teine on võtnud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Niklosamiid võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (tekivad 1...10-l patsiendil 1000-st):
Soole- või maokrambid või valu
Kõhulahtisus
Isutus
Iiveldus või oksendamine

Harvaesinevad kõrvaltoimed (tekivad 1...10-l patsiendil 10 000-st):
Pearinglus või peapööritus
Unisus
Sügelus pärasoole piirkonnas
Nahalööve
Ebameeldiv maitse suus

Kõrvaltoimetest teatamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas niklosamiidi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Säilitamise kohta vt infot pakendilt

6. Muu teave

Abiained vt pakendilt.

Müügiloa hoidja

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel.

Infoleht on viimati uuendatud veebruar 2026