PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Akamprosaat tahke suukaudne ravimvorm 333 mg

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on akamprosaat ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne akamprosaadi võtmist
3. Kuidas akamprosaati võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas akamprosaati säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on akamprosaat ja milleks seda kasutatakse

Akamprosaati kasutatakse alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäirete ravis täiskasvanutel.
Ravim toimib kesknärvisüsteemile (aju ja seljaaju). See aitab säilitada alkoholist hoidumist alkoholisõltuvusega patsientidel. Akamprosaat koos nõustamisega aitab teil alkoholi mitte tarvitada. See toimib keemilistele muutustele, mis on ajus toimunud aastate jooksul, mil olete alkoholi tarvitanud. See ei takista pideva alkoholi kuritarvitamise kahjulikke mõjusid.

2. Mida on vaja teada enne akamprosaadi võtmist

Ärge võtke akamprosaati:

- kui olete akamprosaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline.
- kui te toidate last rinnaga.
- kui teil on neerufunktsiooni langus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne akamprosaadi võtmist pidage nõu oma arstiga:

- kui olete alla 18-aastane või üle 65-aastane patsient.
- kui teil on raske maksahaigus.

Nendel juhtudel ei ole soovitatav ravimit võtta.

Kui te tarvitate liiga palju alkoholi, kohaneb teie keha ja eriti närvisüsteem alkoholi mõjuga. Kui te seejärel järsku joomise lõpetate, võivad teil tekkida ebameeldivad sümptomid, mida nimetatakse alkoholi võõrutussündroomiks. Te peaksite akamprosaati võtma niipea kui võimalik pärast võõrutusperioodi.

Kuna alkoholisõltuvuse all kannatavad patsiendid kannatavad sageli ka depressiooni all ja neil on enesetapumõtete oht, on soovitatav teid jälgida depressiooni sümptomite ja enesetapumõtete suhtes.

Muud ravimid ja akamprosaat

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Akamprosaati on patsientidele sageli manustatud koos teiste ravimitega, mida kasutatakse alkoholi võõrutusnähtude raviks või hoidmiseks. Siiani ei tundu akamprosaat segavat teiste ravimite toimet, kuid kui teile on välja kirjutatud diureetikumid (vee väljaviivad tabletid), pidage nõu oma arstiga.

Akamprosaat koos alkoholiga
Alkoholi joomine ravimi võtmise ajal ei tekita iiveldust, kuid ärge jooge ravi ajal üldse alkoholi. Isegi väikese koguse alkoholi tarbimisega on oht, et ravi ebaõnnestub ja võite uuesti jooma hakata.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Kogemus ravi kohta raseduse ajal on piiratud. Seetõttu peaksid rasedad naised akamprosaati kasutama ainult siis, kui arst on hinnanud, et ravi kasu kaalub üles võimaliku riski lootele.
Kui te toidate last rinnaga, ärge võtke akamprosaati, sest ei ole teada, kas see ravim eritub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Akamprosaadil ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

3. Kuidas akamprosaati võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine
Täiskasvanud vanuses 18–65 aastat:
- Kui te kaalute 60 kg või rohkem, on soovitatav annus 6 tabletti päevas: 2 tabletti hommikul, 2 tabletti keskpäeval ja 2 tabletti õhtul koos toiduga.
- Kui te kaalute alla 60 kg, on soovitatav annus 4 tabletti päevas: 2 hommikul, 1 keskpäeval ja 1 õhtul koos toiduga.

Ravi kestus
Akamprosaati on soovitatav võtta üks aasta.

Manustamisviis
Neelake tablett tervelt alla. Ärge närige ega purustage tabletti, kuna see võib kahjustada tableti katet.

Kui te võtate akamprosaati rohkem kui ette nähtud

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või keegi teine on võtnud liiga suure annuse seda ravimit. Võivad esineda kõhulahtisuse sümptomid, nagu sagedane vesine väljaheide, kõhukrambid, kõhuvalu, palavik, iiveldus ja oksendamine.

Kui te unustate akamprosaati võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Kui unustate annuse võtmata, võtke see niipea kui võimalik ja seejärel võtke järgmine annus õigel ajal.
Kui te lõpetate akamprosaadi võtmise

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui märkate mõnda järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest, lõpetage akamprosaadi võtmine ja võtke kohe ühendust oma arstiga:
Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st)
• raske allergiline reaktsioon, mis põhjustab nahalöövet, sügelust või nõgestõbi (urtikaaria), näo, huulte, keele või muude kehaosade turset (angioödeem) või õhupuudust, hingamisraskusi koos lööbe, turse, vilistava hingamise ja minestustundega (anafülaksia reaktsioon)

Muud kõrvaltoimed on järgmised:
Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)
• kõhulahtisus

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)
• kõhuvalu
• iiveldus
• oksendamine
• liigne gaaside teke maos või soolestikus (puhitus)
• punane täpiline nahalööve
• vähenenud seksuaalne iha (libiido)

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)
• suurenenud seksuaalne iha (libiido)

Teadmata (sagedust ei saa olemasolevate andmete põhjal hinnata)
• villiline lööve mida iseloomustavad nahal vedelikuga täidetud laigud (vesikulaar-bulloossed lööbed).

Kõrvaltoimetest teatamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas akamprosaati säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Säilitamise kohta vt infot pakendilt

6. Muu teave

Abiained vt pakendilt.

Müügiloa hoidja

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel.

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2026