PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Prasosiin, 1 mg; 2 mg, tahke suukaudne ravimvorm

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on prasosiin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne prasosiini võtmist
3. Kuidas prasosiini võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas prasosiini säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on prasosiin ja milleks seda kasutatakse

Prasosiin on alfa retseptorite blokaator. Prasosiin lõõgastab veresooni, mis parandab verevoolu veresoontes ja võimaldab südamel kergemini verd pumbata. Seda tarvitatakse tavaliselt kõrge vererõhu raviks, aga ka südamepuudulikkuse, Raynaud' tõve või meestel esineva eesnäärme kergekujulise suurenemise (prostata hüperplaasia) korral.

Näidustuseväliselt on prasosiini kasutatud posttraumaatilise stressihäirega seotud õudusunenägude puhul.

Kui te pole kindel, miks teile prasosiin määratud on, paluge oma arstil seda teile selgitada.

2. Mida on vaja teada enne prasosiini võtmist

Ärge võtke prasosiini:
- kui olete allergiline prasosiini või mõne sarnase ravimi (tuntud kui kinasoliinravimid) või selle ravimi mis tahes muu koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes. Allergia võib olla põhjustanud sügelust, nahapunetust või hingamisraskusi.
- kui olete alla 12-aastane.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne prasosiini võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Ravimid ei sobi alati kõigile. Enne prasosiini võtmist peab arst teadma, kui mõni järgmistest seisunditest kehtib teie kohta:
- teil on südamepuudulikkus mõne muu südamehaiguse, nt südameklapihaiguse või hiljutise südameataki tõttu. Kui teil on südamepuudulikkus, võib prasosiini toime mitme kuu jooksul järk-järgult väheneda. Sellisel juhul võite märgata jalgade või pahkluude turset vedelikupeetuse tõttu. Kui teil tekib turse või kaalutõus, rääkige sellest oma arstile, kuna teie arst võib pidada vajalikuks muuta prasosiini või teiste teie võetavate ravimite annust.
- olete kunagi pärast urineerimist minestanud.

- teil on maksa- või neeruhaigus.
- teile tehakse silmaoperatsioon katarakti (läätse hägususe) tõttu. Seda seetõttu, et prasosiin võib operatsiooni ajal põhjustada tüsistusi, mida saab hallata, kui teie arst on selleks eelnevalt ette valmistunud. Palun teavitage oma silmaarsti enne operatsiooni, et kasutate või olete varem prasosiini kasutanud.
- teil on pikaajaline erektsioon. Kui erektsioon kestab kauem kui 4 tundi, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Mõnedel patsientidel, võib esineda pearinglust või peapööritust, mis võib olla põhjustatud madalast vererõhust kiirel istuvasse asendisse minekul või püsti tõusmisel. Teatud patsientidel on neid sümptomeid esinenud erektsioonihäirete (impotentsuse) ravimite võtmisel koos prasosiiniga. Nende sümptomite tekkimise tõenäosuse vähendamiseks peaksite enne erektsioonihäirete ravimite võtmise alustamist olema prasosiini tarvitanud regulaarselt ühtlases ööpäevases annuses.

Kui teil tehakse mingeid uuringuid, näiteks uriinianalüüs, teavitage oma arsti prasosiini võtmisest, kuna prasosiin võib tulemust mõjutada.

Muud ravimid ja prasosiin

Teavitage oma arsti, apteekrit või meditsiiniõde, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, sh retseptiravimeid.
Mõned ravimid võivad mõjutada prasosiini toimet. Kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest, teavitage sellest oma arsti enne ravi alustamist:
- kaltsiumikanali blokaatorid, AKE inhibiitorid või beetablokaatorid, mida tavaliselt manustatakse stenokardia ja/või kõrge vererõhu raviks.
- erektsioonihäirete (impotentsuse) ravimid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Prasosiin võib põhjustada pearinglust, unisust või nõrkust. Selliste sümptomite tekkel ärge juhtige autot ega käsitsege tööriistu ega masinaid.

See ravim võib sisaldada väikeses koguses naatriumi (täpsem info vt. pakendilt).

3. Kuidas prasosiini võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Teie arst määrab teile sobiva raviannuse. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Mõnikord võib prasosiin põhjustada peapööritust või nõrkust ja minestust, eriti ravimi esmakordsel manustamisel ja püsti tõustes. Kui ravi põhjustab peapööritust või nõrkust, heitke pikali, kuni tunnete end paremini. Tõuske aeglaselt püsti, kui tunnete end paremini. Kui olete mures, rääkige sellest oma arstile.
Prasosiini ravi alustatakse tavaliselt madalaima võimaliku annusega ja suurendatakse järk-järgult, olenevalt sellest, kuidas te ravile reageerite. Ärge muutke annust ega lõpetage tablettide võtmist ilma eelnevalt arstiga nõu pidamata. Veenduge, et saate uue retsepti enne, kui tabletid otsa saavad.

Eakatel patsientidel alustatakse prasosiini ravi alati madalaima võimaliku annusega.

Kui te võtate prasosiini rohkem kui ette nähtud

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või keegi teine on võtnud liiga suure annuse prasosiini. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa ravimi pakend.

Kui te unustate prasosiini võtta

Võtke unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate prasosiini võtmise

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.
Kui teil on lisaküsimusi ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka prasosiin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rääkige oma arstile või kutsuge kiirabi, kui teil tekib pärast prasosiini võtmist mõni järgmistest allergilise reaktsiooni sümptomitest. Kuigi need on väga haruldased, võivad sümptomid olla rasked ja eluohtlikud ning te võite vajada kiiret arstiabi või haiglaravi:

- Äkiline vilistav hingamine, hingamisraskused, silmalaugude, näo või huulte turse, lööve või sügelus (eriti kui see mõjutab kogu keha).

Prasosiin võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

- minestustunne, minestamine või pearinglus, eriti püsti tõustes (vt lõik 3)
- peavalu, unisus või nõrkus
- ebameeldiv südamepekslemise tunne (palpitatsioonid)
- iiveldus või oksendamine
- energiapuudus, depressioon või närvilisus
- kõhukinnisus või kõhulahtisus
- suukuivus, ninakinnisus või ähmane nägemine
- õhupuudus või lööve
- jalgade, pahkluude või säärte turse
- urineerimise sagenemine

Kui mõni neist põhjustab teile probleeme või kestab kauem kui üks nädal, peaksite pöörduma arsti poole.

Muud kõrvaltoimed, millest on teatatud, on loetletud allpool:

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):

- ebamugavustunne ja/või valu kõhus
- valu rinnus või ebanormaalselt kiire südamerütm
- tundehäired (kipitustunne/„sipelgate jooksmise“ tunne või tuimus)
- sumin või tinnitus kõrvas
- ninaverejooks, silmavalu või punased silmad
- unehäired
- higistamine, sügelus või sügelev nahalööve

- valulikud liigesed
- võimetus või raskused erektsiooni saavutamisel

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

- ebanormaalsed vereanalüüsid maksafunktsiooni hindamiseks
- kõhunäärmevalu või -infektsioon
- ebanormaalselt aeglane südamelöök
- hallutsinatsioonid (asjade ettekujutamine, mida tegelikult pole olemas)
- juuste väljalangemine
- madal vererõhk
- nahaõhetus (punetus)
- positiivne ANA (vereanalüüs, mis kontrollib immuunsüsteemi funktsiooni)
- ebanormaalne rinnakoe areng, eriti meestel
- püsiv erektsioon
- suurenenud kalduvus uinumiseks unehäire (narkolepsia) korral
- uriinipidamatus (inkontinentsi)
- palavik või valu
- veresoonte põletik

Kõrvaltoimetest teatamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas prasosiini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Säilitamise kohta täpsemat infot vt. pakendilt

6. Muu teave

Abiained vt pakendilt.

Müügiloa hoidja
Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel.

Infoleht on viimati uuendatud mais 2026