PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Finasteriid, 5 mg, tahke suukaudne ravimvorm

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on finasteriid ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne finasteriidi võtmist
3. Kuidas finasteriidi võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas finasteriidi säilitada
6. Muu teave

See ravim võib põhjustada kõrvaltoimeid, sealhulgas **depressiooni**. Mõnel juhul võib see kaasa tuua **enesetapumõtteid**. Kui teil tekivad sellised sümptomid, **võtke võimalikult kiiresti ühendust oma arstiga, et saada täiendavat nõu**.

Samuti on teatatud **vähenenud suguihast ja erektsioonihäiretest** (mis mõnel juhul püsisid ka pärast ravi lõpetamist).

Kui teil tekib mistahes kõrvaltoime, sealhulgas selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

1. Mis ravim on finasteriid ja milleks seda kasutatakse

Finasteriid mis kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse 5-alfareduktaasi inhibiitoriteks. Need toimivad meestel eesnäärme suurust vähendavalt.

Finasteriidi kasutatakse eesnäärme healoomulise suurenemise (healoomulise prostata hüperplaasia) raviks ja kontrolli all hoidmiseks. See põhjustab suurenenud eesnäärme suuruse vähenemist, parandab uriinivoolu ja haiguse poolt põhjustatud sümptomeid ning vähendab ägeda uriinipeetuse riski ja kirurgilise sekkumise vajadust.

2. Mida on vaja teada enne finasteriidi võtmist

Finasteriidi ei tohi võtta
- kui olete finasteriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (vt. pakendilt) suhtes allergiline.
- kui te olete rase või võite olla rase. Finasteriid ei ole näidustatud kasutamiseks naistel. Eriline ettevaatus on vajalik naiste puhul, kes on või võivad olla rasedad ning peavad tõenäoliselt kokku puutuma Finasteriid'ga (vt lõik "Rasedus, imetamine ja viljakus").

Finasteriidi ei kasutata lastel.

KAHTLUSE KORRAL KÜSIGE ALATI NÕU OMA ARSTILT VÕI APTEEKRILT.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne finasteriidi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kui teil on suur jääkuriini maht ja/või märkimisväärselt vähenenud uriinivool. Sellisel juhul tuleb teid põhjalikult kuseteede kitsenemise suhtes uurida.
- kui teil on maksafunktsiooni kahjustus. Finasteriidi tase võib nende patsientide vereplasmas olla suurenenud.
- kui teie seksuaalpartner on rase või võib rasestuda, peaksite te teda hoidma kokku puutumast teie seemnevedelikuga, mis võib sisaldada väga väikeses koguses ravimit.

Rinnavähk
Teatage kohe oma arstile, kui te märkate mingeid muutusi oma rinnanäärmekoes, nagu näiteks tükke, valu, rinnanäärmekoe suurenemist või eritist nibudest, kuna need võivad olla tõsise seisundi, nagu rinnanäärmevähi nähud.

Toime prostata-spetsiifilise antigeenile (PSA)
Enne finasteriidiga ravi alustamist ja ravi ajal tuleb teil teostada kliiniline läbivaatus (sh pärasoole läbivaatus käega) ja määrata prostata-spetsiifilist antigeeni (PSA) vereseerumist. See ravim vähendab seerumi PSA kontsentratsiooni, mida tuleb diferentsiaaldiagnoosi tegemisel arvesse võtta.

Meeleolu muutused ja depressioon
Finasteriidiga ravitud patsientidel on teatatud meeleolu muutustest, sealhulgas meeleolu langus, depressioon ja harvematel juhtudel suitsiidimõtted. Kui teil esineb mõni nendest sümptomitest, pöörduge abi saamiseks oma arsti poole nii kiiresti kui võimalik.

Muud ravimid ja finasteriid
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.
Olulisi koostoimeid teiste ravimitega ei ole täheldatud.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Finasteriid on mõeldud kasutamiseks ainult meestel.
Kui te olete rase või võite rasestuda, ärge puutuge kokku katkiste ega purustatud finasteriidi tablettidega. Kui finasteriid imendub meessoost loodet kandval rasedal naisel läbi naha või võetakse seda suu kaudu, võib laps sündida suguorganite väärarenguga. Tabletid on kaetud õhukese polümeerikattega, mis hoiab ära kokkupuute finasteriidiga, eeldusel, et tabletid ei ole purunenud ega purustatud.
Kui patsiendi seksuaalpartner on rase või võib rasestuda, peab patsient kas hoidma oma partnerit kokku puutumast tema seemnevedelikuga (nt kasutades kondoomi) või katkestama ravi finasteriidiga.
Ei ole teada, kas see ravim eritub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Puuduvad andmed selle kohta, et finasteriid mõjutaks autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

Finasteriid võib sisaldada laktoosi ja naatriumi (vt. pakendilt)
Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi võtmist konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas finasteriidi võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on 1 tablett ööpäevas (vastab 5 mg-le finasteriidile).

Õhukese polümeerikattega tablette võib võtta kas tühja kõhuga või koos söögiga. Õhukese polümeerikattega tabletid tuleb neelata alla tervelt, neid ei tohi poolitada ega purustada.

Ehkki paranemismärke võib näha lühikese aja jooksul, on vajalik vähemalt kuuekuuline ravi, et hinnata, kas rahuldav ravivastus on saavutatud.

Teie arst ütleb teile, kui kaua te peate jätkama finasteriidi võtmist. Ärge katkestage ravi enneaegselt, sest sümptomid võivad taastuda.

Maksafunktsiooni kahjustus
Puudub kogemus finasteriidi kasutamise kohta maksafunktsiooni häirega patsientidel (vt ka lõik "Hoiatused ja ettevaatusabinõud").

Neerufunktsiooni kahjustus
Annuste kohandamine ei ole vajalik. Hemodialüüsi vajavatel patsientidel ei ole finasteriidi kasutamist seni uuritud.

Eakad
Annuste kohandamine ei ole vajalik.

Kui teil on tunne, et finasteriidi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate finasteriidi rohkem, kui ette nähtud
Kui te võtate finasteriidi rohkem, kui ette nähtud või kui lapsed on võtnud kogemata ravimit, teavitage palun koheselt oma arsti.

Kui te unustate finasteriidi võtta
Kui te unustate võtta finasteriidi annuse, võite te selle sisse võtta niipea, kui see teile meenub. Seda välja arvatud juhul, kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus, sellisel juhul peaksite te ravimi võtmist jätkama nii nagu määratud. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allergilised reaktsioonid
Kui teil on tekkinud allergiline reaktsioon, lõpetage ravimi võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole. Nähtude hulka võivad kuuluda:
- huulte, näo, keele ja kõri turse
- neelamisraskused
- nahalööve, kihelus või nahaalused kühmud (nõgestõbi)
- hingamisraskused.

Teised kõrvaltoimed

Sage (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st):
- raskused erektsiooni saavutamisel (impotentsus)
- vähenenud seksuaalne aktiivsus
- seemnevedeliku koguse vähenemine seksuaalvahekorra ajal. Seemnevedeliku vähenemine ei mõjuta tavapärast seksuaalfunktsiooni.

Ülalmainitud kõrvaltoimed võivad finasteriidi võtmise jätkamisel aja jooksul kaduda. Kui ei, siis taanduvad need tavaliselt pärast finasteriidi võtmise lõpetamist.

Aeg-ajalt (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st)
- lööve
- rinnanäärmete turse või hellus
- ejakulatsioonihäired, mis võivad jätkuda ravimi võtmise lõpetamisel.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)
- ärevus
- enesetapumõtted
- palpitatsioonid (enda südamelöökide tundmine)
- muutused vereanalüüside tulemustes, mis näitavad muutusi maksa töös
- valu munandites
- meeste viljatus ja/või seemnerakkude kehv kvaliteet; teadete alusel on seemnerakkude kvaliteet paranenud pärast ravi lõpetamist
- depressioon
- suguiha vähenemine, mis võib jääda püsima ka pärast ravi lõpetamist
- erektsiooni- ja ejakulatsiooniprobleemid, mis võivad jääda püsima ka pärast ravi lõpetamist
- vere esinemine spermas.

Te peate viivitamatult teavitama oma arsti mis tahes muutustest teie rinnanäärmekoes, nt tükid, valu, suurenemine või eritis rinnanibudest, sest need võivad olla tõsise seisundi, nt rinnanäärmevähi nähud. Finasteriid võib mõjutada PSA laboriuuringu tulemusi.

Kõrvaltoimetest teatamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu.

5. Kuidas finasteriidi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Säilitamise kohta vt infot pakendilt

6. Muu teave

Abiained vt pakendilt.

Müügiloa hoidja

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel.

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2026.