PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Tropikamiid + fenüülefriin + lidokaiin, Süstelahus (silma eeskambri sisene manustamine)
0,2mg+3,1mg+10mg/ml

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on tropikamiid + fenüülefriin + lidokaiin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne tropikamiid + fenüülefriin + lidokaiini võtmist
3. Kuidas tropikamiid + fenüülefriin + lidokaiini võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas tropikamiid + fenüülefriin + lidokaiini säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on tropikamiid + fenüülefriin + lidokaiin ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine tropikamiid + fenüülefriin + lidokaiin on ravim, mis koosneb kolmest eri komponendist – tropikamiid (antikolinergiline, blokeerib närviimpulsi liikumist teatud närvides), fenüülefriin (alfa sümpatomimeetik – jäljendab teatud närvide impulsse) ja lidokaiin (kohalik tuimesti).

Ravimit kasutatakse silmasisese süstena pupilli laiendamiseks keratiidi, iridotsükliidi, katarakti ja mädase endoftalmiidi korral.

2. Mida on vaja teada enne tropikamiid + fenüülefriin + lidokaiini kasutamist

Tropikamiid + fenüülefriin + lidokaiini ei tohi kasutada:

- kui olete tropikamiid + fenüülefriin + lidokaiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline
- kui teil on allergia amiidi tüüpi lokaalanesteetikumide vastu (näiteks artikaiin, bupivakaiin, prilokaiin, ropivakaiin)
- kui teil on allergia atropiini derivaatide vastu
- alla 12-aastastel lastel

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
<u>Tropikamiid + fenüülefriin + lidokaiini kasutamine ei ole soovitatav, kui:</u>
- Plaanis on kombineeritud operatsioon katarakti tõttu koos vitrektoomiaga
- Teie silma eeskamber on madal
- Teil on ananeesis äge silmasisese rõhu tõus (sulteud nurga glaukoom)

<u>Enne tropikamiid + fenüülefriin + lidokaiini kasutamist pidage nõu oma arstiga:</u>
- kui teil on kõrgenenud vererõhk
- arterite seinade paksenemine (ateroskleroos)
- südamehaigus, eriti kui see mõjutab südamerütmi

- vastunäidustus vererõhku tõstvate ravimite suhtes (näiteks epinefriin (adrenaliin), norepinefriin (noradrenaliin), dopamiin, dobutamiin) süsteemsel kujul
- kilpnäärme ületalitlus (hüpertüreoidism)
- eesnärmehaigus
- krambihood (epilepsia)
- maksa või neeruhaigus
- probleeme hingamisega
- lihasnõrkus (*myasthenia gravis*)

Lapsed ja noorukid

Kasutamine alla 12-aastastel lastel on vastunäidustatud, sest fenüülefriini ja tropikamiidi sisaldavate silmaravimite kasutamisel on teatatud tõsistest süsteemsetest kõrvaltoimetest, eriti lastel, nagu kardiovaskulaarne häire koos raske hüpertensiooniga, südame löögisageduse muutused, ~~ja~~ kopsuturse ning enneaegsetel imikutel nekrotiseeriv enterokoli**it**

Muud ravimid ja tropikamiid + fenüülefriin + lidokaiin

Teatage oma arstile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tropikaiin + fenüülefriin + lidokaiin võib mõjutada teie võimet autot juhtida või mehhanisme kasutada. Seetõttu ei peaks te seda tegema, kuni teie nägemine on täielikult taastunud.

3. Kuidas tropikamiid + fenüülefriin + lidokaiini kasutada

Ravim on mõeldud kasutamiseks silmakirurgi poolt operatsiooni alguses. Ravimit peaks kasutama ainult siis, kui operatsioonieelselt on täheldatud piisavat pupilli dilatatsiooni toopilise müdriaatikumi manustamisel.

Tavaline doos on 0,2ml lahust ühe süstena. Täiendavat doosi ei peaks manustama, sest ei ole täheldatud suuremat efekti, samas on märgatud suuremat endoteeli rakkude kadu.

Kui te saate tropikamiid + fenüülefriin + lidokaiini rohkem kui ette nähtud

Üleannustamine on ebatõenäoline, kuna ravimit manustab silmakirurg. Üledoseerimine võib viia suurenenud sarvkesta endoteeli rakkude kaoni.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed:
Pöörduge viivitamatult arsti poole, kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest: hingamisraskus, pearinglus, minestamine, südame löögisageduse kiirenemine, näo, kõri või teiste kehaosade turse ja higistamine. Need võivad olla anafülaktilise reaktsiooni (ootamatu raske allergiline reaktsioon) sümptomid.

Tropikamiid + fenüülefriin + lidokaiin võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid:
Kuni 1 inimesel 100st: läätse rebend, reetina turse, peavalu, keratiiti, suurenenud silma siserõhk, silma punetus, kõrgenenud vererõhk.

Esinemissagedus teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):
- vedelik või turse kopsudes
- raske soolehaigus verise väljaheitega (nekrotiseeriv enterokoliit) enneaegsetel imikutel
- kahvatus silmade ümbruses enneaegsetel imikutel.

Kõrvaltoimetest teatamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas tropikamiid + fenüülefriin + lidokaiini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Säilitamise kohta vt infot pakendilt

6. Muu teave

Abiained vt pakendilt.

Müügiloa hoidja

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel.

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2026.