PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Kõhutüüfuse tekitaja, puhastatud polüsahhariidantigeen, parenteraalne ravimvorm, 25mcg 0,5ml
Kõhutüüfuse polüsahhariidvaktsiin

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis on kõhutüüfuse polüsahhariidvaktsiin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne kõhutüüfuse polüsahhariidvaktsiini kasutamist
3. Kuidas kõhutüüfuse polüsahhariidvaktsiini kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas kõhutüüfuse polüsahhariidvaktsiini säilitada
6. Muu teave

1. Mis on kõhutüüfuse polüsahhariidvaktsiin ja milleks seda kasutatakse

Kõhutüüfuse polüsahhariidvaktsiin on vaktsiin, mis sisaldab kõhutüüfuse tekitaja puhastatud polüsahhariidantigeeni. Vaktsiinid kaitsevad nakkushaigustesse haigestumise eest.

See vaktsiin on ette nähtud kõhutüüfuse vastaseks aktiivseks immuniseerimiseks täiskasvanutele ja lastele üle 2 aasta vanuselt reisimisel endeemilisse piirkonda. See vaktsiin ei ole ette nähtud alla 2-aastastele lastele kuna immuunvastus võib jääda ebapiisavaks.

Kui vaktsiini manustatakse teile või teie lapsele, toodab teie keha loomulik kaitsevõime antikehasid kõhutüüfuse vastu.

Kõhutüüfus on nakkushaigus. Sümptomid on peavalu ja palavik, mis süvenevad 3-4 päeva jooksul. Täiendavad sümptomid on köha, kurguvalu ja muutunud käitumine.

See vaktsiin kaitseb ainult kõhutüüfuse vastu. See ei toimi ühtegi teise haigusesse nagu paratüüfus või toidumürgitus. See vaktsiin ei põhjusta kõhutüüfust.

Nagu kõigi vaktsiinide puhul, ei pruugi kõhutüüfuse polüsahhariidvaktsiiniga vaktsineerimine esile kutsuda kaitsereaktsiooni kõigil vaktsineeritavatel.

2. Mida on vaja teada enne kõhutüüfuse polüsahhariidvaktsiini kasutamist

Kõhutüüfuse polüsahhariidvaktsiini ei tohi kasutada, kui teie või teie laps on:
- selle vaktsiini mis tahes koostisosade (vt. pakendilt) suhtes allergiline;
- allergiline formaldehüüdi või kaseiini suhtes, mida on kasutatud selle vaktsiini tootmisel, mistõttu vaktsiin võib sisaldada nende jälgi;
- palavikus, esineb äge haigus (sellisel juhul tuleb vaktsineerimine edasi lükata).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne kõhutüüfuse polüsahhariidvaktsiini kasutamist pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega, kui teil või teie lapsel on:
- hemofiilia või mõni teine verevalumeid ja veritsust soodustav haigus, sest süstekohal võib tekkida veritsus;
- puudulik või nõrk immuunsüsteem järgmistel põhjustel:
    - kortikosteroidide, tsütotoksiliste ravimite, kiiritusravi või teiste immuunsust nõrgestavate ravide tõttu. Teie arst või meditsiiniõde võib oodata ravi lõppemiseni.
    - HIV (inimese immuunpuudulikkuse viirus) nakkus või mõni teine immuunsust nõrgestav haigus. Soovitatav on vaktsiin manustada, kuigi kaitsetoime ei pruugi olla nii tugev, kui terve immuunsüsteemi korral.

Pärast ükskõik millist nõelatorget, või isegi enne seda, võib tekkida minestamine (peamiselt noorukitel). Rääkige oma arstile või meditsiiniõele, kui teie olete/teie laps on mõne varasema süsti korral minestanud.

Muud ravimid ja kõhutüüfuse polüsahhariidvaktsiin
Kõhutüüfuse polüsahhariidvaktsiini võib manustada samaaegselt teiste vaktsiinidega (kollapalaviku, difteeria, teetanuse, poliomüeliidi, marutõve, meningokoki A+C, A ja B-hepatiidi vaktsiiniga) kasutades erinevaid süstekohti.

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, kavatsete rasestuda või toidate last rinnaga, öelge seda oma arstile või meditsiiniõele. Nemad otsustavad vaktsineerimise edasi lükkamise üle.
Seda vaktsiini tohib kasutada raseduse ja imetamise ajal ainult arsti nõusolekul.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Mõnedel inimestel on täheldatud väsimust pärast vaktsineerimist, mistõttu peate olema ettevaatlik autojuhtimisel või masinatega töötamisel. Kui teil esineb väsimust, ärge juhtige autot ega töötage masinatega.

Kõhutüüfuse polüsahhariidvaktsiin võib sisaldada naatriumi

3. Kuidas kõhutüüfuse polüsahhariidvaktsiini kasutada

Seda vaktsiini manustab teile ainult vaktsineerimise väljaõppe saanud arst või meditsiiniõde, kellel on kättesaadav vaktsineerimisjärgselt harva esineda võiva raske allergilise reaktsiooni koheseks raviks sobiv varustus.

Annustamine
Kaitse tagab üks süst (0,5 ml). Manustatakse täiskasvanutele ja lastele üle 2. eluaasta.
Vaktsiini tuleb manustada vähemalt 2 nädalat enne kõhutüüfuse leviku piirkonda reisimist.
Juhul, kui tüüfusega kokkupuutumise oht püsib, tuleb revaktsineerimine läbi viia iga 3 aasta järel.

Manustamisviis
Arst või meditsiiniõde loksutab süstlit vahetult enne manustamist ja kontrollib, et vedelik oleks värvusetu ja et seal ei oleks võõrkehasid.

Vaktsiin süstitakse lihasesse või sügavale naha alla.
Arst või meditsiiniõde ei tohi vaktsiini süstida veresoonde.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega**.**

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see vaktsiin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised allergilised reaktsioonid:
Anafülaktilised, anafülaktoidsed reaktsioonid, sh šokk, mis võivad esineda ühe või mitme alljärgneva sümptomiga:
- nõgestõbi, nahalööve,
- näo- ja/või kõrituse,
- hingamisraskused, keele või huulte siniseks värvumine,
- madal vererõhk, kiire südame löögisagedus ja nõrk pulss, külm nahk, pearinglus ja võimalik kollaps.

Need nähud ja sümptomid esinevad enamasti kuni 30 minuti jooksul pärast süstimist, kui patsient on veel kliinikus või arstikabinetis. Kui teil esineb mõni nendest sümptomitest pärast meditsiiniasutusest lahkumist, kus teid vaktsineeriti, võtke KOHESELT ühendust arstiga.

Teised kõrvaltoimed

Enamik teatatud kõrvaltoimeid tekkis 3 päeva jooksul pärast vaktsineerimist. Enamik kõrvaltoimeid taandus 1 kuni 3 päeva jooksul pärast kõrvaltoime teket. Teatatud kõrvaltoimete esinemissagedus on toodud alljärgnevalt:

Väga sage: võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st
- süstekoha valu, süstekoha punetus(1), süstekoha turse(1), süstekoha kõvastumine(1),
- peavalu(1),
- lihasvalu,
- üldine halb enesetunne(2),
- väsimus(2), ebaloomulik jõuetus(2).

Sage: võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st
- palavik(3)

Aeg-ajalt: võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st
- süstekoha sügelus(4)

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel
- seerumtõbi: liigesvalu, nahalööbed, suurenenud lümfisõlmed ja üldine halb enesetunne. Need sümptomid võivad tekkida tavaliselt 2-4 nädala jooksul pärast vaktsineerimist.
- minestamine reaktsioonina nõelatorkele,
- köha, vilisev hingamine, hingamisraskus (astma),
- iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu,
- lööve, mis võib olla mõnikord koos nahatursega ja sügelev (sh nõgestõbi),

- liigesvalu.

(1) "Sage" täiskasvanutel,
(2) "Sage" lastel ja noorukitel (2 kuni 17 eluaastat),
(3) ei ole teatatud täiskasvanutel,
(4) ei ole teatatud lastel ega noorukitel (2 kuni 17 eluaastat).

Kõrvaltoimetest teatamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas kõhutüüfuse polüsahhariidvaktsiini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Kontrollige välispakendilt ja/või pakendiga kaasas olevast võõrkeelsest infolehest säilitamise täpseid tingimusi.
Ravimit hoida külmkapis (2 °C…8 °C). Mitte lasta külmuda. Hoida süstlit välispakendis valguse eest kaitstult.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud süstli etiketile ja karbile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Muu teave

Abiained vt. pakendilt.

Müügiloa hoidja

Ravimit turustatakse Ravimiameti eriloa alusel.

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2026.