

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

ANTREX, 15 mg tabletid Kaltsiumfolinaat

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel,

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile

Infolehes antakse ülevaade:

- 1.Mis ravim on Antrex ja milleks seda kasutatakse
- 2.Mida on vaja teada enne Antrex'i võtmist
- 3.Kuidas Antrex'it võtta
- 4.Võimalikud kõrvaltoimed
- 5.Kuidas Antrex'it säilitada
- 6.Lisainfo

1. MIS RAVIM ON ANTREX JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Kaltsiumfolinaati kasutatakse foolhappe defitsiidist põhjustatud aneemia (kehvveresus) raviks. Lisaks kasutatakse kaltsiumfolinaati mitmete vähivastaste ravimite, näiteks metotreksaadi, kõrvaltoimete ärahoidmiseks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ANTREX'I VÕTMIST

Ärge kasutage Antrex'it

- Kui te olete ülitundlik (allergiline) kaltsiumfolinaadi või ravimi mõne koostisosa suhtes
- kui teil on vitamiin B₁₂ defitsiidist põhjustatud aneemia

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kaltsiumfolinaat võib mõjutada teatud vähivastaste ravimite, antibiootikumide ja epilepsiavastaste ravimite efektiivsust.

Rasedus ja imetamine

Kasutamise kohta raseduse ja rinnaga toitmise ajal palun konsulteerige oma arstiga.

3. KUIDAS ANTREX'IT VÕTTA

Võtke kaltsiumfolinaadi tablette alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Raviarst määrab teile vajaliku annuse ja ravi kestuse lähtuvalt teie üldseisundist. Järgige täpselt arsti ettekirjutusi ja ärge kunagi ise annust muutke. Pidage kinni kokkulepetest arstiga regulaarsete läbivaatuse teostamiseks.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Antrex'it rohkem kui ette nähtud

Kui võtate kogemata liiga palju ravimit, teatage sellest koheselt arstile.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Antrex põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kaltsiumfolinaadi tablette talutakse üldiselt hästi. Väga harva võivad esineda ülitundlikkusreaktsioonid.

Kui ravimit kasutatakse koos 5-fluorouratsiiliga (vähivastane ravim), võivad teil 5-fluorouratsiili poolt põhjustatud kõrvaltoimed tugevneda.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate endal mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

5. KUIDAS ANTREX'IT SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud, kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C

Ärge kasutage Antrex'it pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Antrex sisaldab

Toimeaine on kaltsiumfolinaat.

Abiained on laktoos, mikrokristalliline tselluloos ja magneesiumstearaat.

Kuidas Antrex välja näeb ja pakendi sisu

Tabletid 15 mg.

Pakendis 10 või 100 tabletti.

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuaris 2010