

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Bensatiinbensüülpenitsilliin
Süstelahuse pulber, viaalis 2 400 000 TÛ

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on bensatiinbensüülpenitsilliin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne bensatiinbensüülpenitsilliini kasutamist
3. Kuidas bensatiinbensüülpenitsilliini kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas bensatiinbensüülpenitsilliini säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON .BENSATIINBENSÜÜLPENITSILLIIN JA MILLEKS TEDA KASUTATAKSE

Bensatiinbensüülpenitsilliin on pikaajalise toimega depoopenitsilliin. Tingituna bensatiinbensüülpenitsilliini farmakokineetilistest omadustest on ravim tõhus ainult penitsilliinile väga tundlike mikroorganismide suhtes, näiteks treponeemid (süüfilise tekitajad) ja streptokokid (v.a. enterokokid) suhtes.

Bensatiinbensüülpenitsilliin omab bakteritsiidset toimet, pärssides mikroorganismide rakuseina koostisesse kuuluvate mukoproteiinide sünteesi. Pärast bensatiinbensüülpenitsilliini lihasesisest manustamist algab selle vabanemine ja ravim püsib veres pika aja vältel.

Bensatiinbensüülpenitsilliin on näidustatud penitsilliinile tundlike patogeenide poolt põhjustatud infektsioonide (nakkuste) raviks (nt süüfilis).

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE BENSATIINBENSÜÜLPENITSILLIINI KASUTAMIST

Bensatiinbensüülpenitsilliini ei tohi kasutada:

- Kui teil esineb teadaolev ülitundlikkus penitsilliinirea preparaate suhtes. Tuleb arvestada ristuva allergia võimalusega (5...10% juhtudest) tsefalosporiinide suhtes ülitundlikel patsientidel.
- Seda preparaati ei tohi manustada nahaalusi, intravenoosselt, intralumbaalselt ega kehaõõnesiseselt.

Teil kasutatavas ravimis sisalduvate abiainete kohta teavet, palun, küsige oma arstilt. Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Pidage nõu oma arstiga kui:

- olete allergiale kalduv inimene
- põete suhkruhaigust, sest suhkruhaigetel võib ravimi imendumine lihasdepoost olla aeglustunud
- põete astmat ning teil esineb mitme ravimi suhtes ülitundlikkuse nähtusid.

Muud ravimid ja bensatiinbensüülpenitsilliin

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid.

See on väga oluline, sest kasutades korraga rohkem kui ühte ravimit, võivad nende toimed tugevneda või nõrgeneda.

Tähelepanu nõuab põletikuvastaste ravimite ja palavikku alandavate ravimite (eeskätt indometatsiin, fenüülbutasoon ja salitsülaadid) samaaegne kasutamine, kuna need võivad konkureerivalt pärssida penitsilliini eritumist.

Enne ravimi kasutamist, palun konsulteerige arstiga.

3. KUIDAS BENSATIINBENSÜÜLPENITSILLIINI KASUTADA

Juhised, millal ja kuidas manustada, annab teile arst või õde.

Seda preparaati tohib manustada ainult lihasesisese süstimise teel.

Selle preparaadi kasutamine ja asjakohane annustamine on iga konkreetse patsiendi puhul individuaalsed. Üldiselt soovitatakse süüfilise raviks manustada 2,4 miljonit TÛ ühekordselt (süstituna 1,2 miljonit TÛ ühte tuharasse ja 1,2 miljonit TÛ teise tuharasse) 1. ravipäeval (varane süüfilis) või 1., 8. ja 15. ravipäeval (hiline süüfilis).

Allergilise reaktsiooni ilmnemisel tuleb preparaadi manustamine koheselt lõpetada ja rakendada asjakohast ravi.

Kui teil tekib küsimusi ravimi manustamise kohta, võtke ühendust oma arstiga.

Ärge muutke ise ettenähtud annust.

Kui teile manustatakse bensatiinbensüülpenitsilliini rohkem kui ette nähtud

Kui teil on kahtlus, et teile manustati liiga suur annus ravimit, võtke kohe ühendust oma arsti, apteekri või lähima haiglaga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kohta, pidage nõu oma arstiga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka bensatiinbensüülpenitsilliin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Olulisemad kõrvaltoimed võivad olla allergilised reaktsioonid (anafülaksia, urtikaaria, kehatemperatuuri tõus, liigesevalud, angioneurootiline ödeem, multiformne erüteem ja eksfoliativne dermatiit). Süüfilise ravi ajal võib tekkida treponeemi antigeenide vabanemisest Jarisch-Herxheimeri reaktsioon (palavik, lööve, adenopaatia, hüpotensioon).

Harvem võib ravimi süstimise järgselt tekkida stomatiit või glossiit.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. BENSATIINBENSÜÜLPENITSILLIINI SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage ravimpreparaati pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on koostöölstatud detsembris 2013