

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Fulcin 125 mg tabletid

Fulcin 500 mg tabletid

Griseofulviin

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusümptomid on sarnased
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile

Infolehes antakse ülevaade:

- 1.Mis ravim on Fulcin ja milleks seda kasutatakse
- 2.Mida on vaja teada enne Fulcin'i võtmist
- 3.Kuidas Fulcin'i võtta
- 4.Võimalikud kõrvaltoimed
- 5.Kuidas Fulcin'i säilitada
- 6.Lisainfo

1. MIS RAVIM ON FULCIN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Griseofulviin on seentevastane antibiootikum, mis pärsib seeneraku paljunemist. Seda kasutatakse griseofulviinile tundlike seente poolt põhjustatud naha, juustega kaetud peanaha ja küünte seeninfektsioonide raviks. Griseofulviini tabletid on näidustatud juhul, kui paikne ravi on osutunud ebaefektiivseks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE FULCIN'I VÕTMIST

Ärge võtke Fulcin'i

- kui teil on allergia (ülitundlikkus) griseofulviinile või selle ravimi mõne teise koostisaine suhtes või penitsilliinidele;
- kui teil on porfüüria (ainevahetushaigus)
- kui teil esineb erütematoosne luupus (süsteemne sidekoehaigus) või teised sarnased seisundid
- raseduse korral

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Fulcin

- kui Teil esineb maksahaigus
- kui te tarbite alkoholi, sest griseofulviin võib tugevdada alkoholi toimet
- kui plaanitakse eostada last, sest griseofulviin võib kahjustada spermarakke, mistõttu eostamist võib planeerida alles 6 kuud pärast ravi lõpetamist

- kui planeeritakse rasestuda, sest griseofulviin võib põhjustada loote väärarengut, mistõttu võib rasestuda alles 1 kuu pärast ravi lõpetamist
- võimaliku fotosensibilisatsiooni (valguse suhtes tundlikkuks muutumine) tekkimise suhtes, mistõttu hoiduge võimalusel otsesest päikesevalgusest, päevituslampide ja solaariumi kasutamisest kuna see võib põhjustada tavapärasest suuremat naha tundlikkust UV-kiirte suhtes, põhjustades nahalöövet, sügelust, punetust või naha värvuse kaotust või rasket päikese põletust.

Kindlasti rääkige oma arstiga, kui Teil esineb mõni tervise probleem.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid.

Oluline on, et teie arst teaks, kui te tarvitate mõnda järgnevatest ravimitest:

- antikoagulandid (hüübimisvastased ravimid), sest griseofulviin võib vähendada antikoagulantide toimet
- östrogeeni sisaldavad suukaudsed kontratseptiivid (rasestumisvastased tabletid), sest griseofulviin võib nõrgestada rasestumisvastast toimet, võib tekkida vaheveritsus ja amenorröa (menstruatsiooni puudumine).

Rasedus ja imetamine

Raseduse ajal on griseofulviin vastunäidustatud.

Griseofulviini tarvitamise ajal ja ühe kuu jooksul peale selle tarvitamist tuleks kasutada täiendavaid rasestumisvastaseid vahendeid.

Ei ole teada, kas griseofulviin eritub rinnapiima. Ohutus imikule ei ole tõestatud, mistõttu griseofulviin-ravi ajal ei ole soovitatav last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Griseofulviin võib mõnedel inimestel vähendada reaktsioonikiirust ning põhjustada peeringlust ja koordinatsioonihäireid.

3. KUIDAS FULCIN'I VÕTTA

Võtke Fulcin'i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Tavaliselt täiskasvanutele (sh eakad patsiendid) 500 mg ööpäevas, manustatuna pärast sööki ühekordse või mitme annusena.

Raskematel juhtudel võib manustada 1000 mg ööpäevas, vähendades annust ravivastuse ilmnemisel.

Lastele 10 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas, jagatuna 2-3 annuseks, manustatuna pärast sööki.

Ravikuuri pikkus sõltub haiguse tüübist. Visalt paranevate infektsioonide (nakkuste) ravi võib kesta kuni 12 kuud.

Täieliku ravitoime saavutamiseks tuleb griseofulviin-ravi ajal järgida üldiseid hügieeninõudeid, pöörates erilist tähelepanu infektsiooni võimalikele allikatele.

Kui te unustate Fulcin'i võtta

Kui teil Fulcin'i annus on jäänud võtmata, võtke see esimesel võimalusel. Kui see meenub alles siis kui on käes aeg võtta järgmine annus, jätke võtmatajäänud annus vahele ning jätkake ravimi võtmist vastavalt endisele raviplaanile. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Fulcin'i võtmise

Ärge jätke vahele ühtki annust.

Aitamaks kaasa täielikule paranemisele infektsioonist jätkake ravimi võtmist kogu ettenähtud raviperioodi jooksul isegi kui Teie enesetunne paraneb mõni päev pärast ravi algust.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Fulcin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Griseofulviin on üldiselt hästi talutav.

Harva on täheldatud sügelust (nõgestõbi), nahalööbeid, peavalu ja seedehäireid, kuid enamasti need mööduvad ravi ajal. Võivad tekkida pearinglus, väsimus, samuti granulotsütopeenia (granulotsüütide väike hulk veres) ja leukopeenia (valgeliblede vähesus veres). Griseofulviinravi ajal võib tekkida naha suurenenud tundlikkus päikesevalguse suhtes. Harva on tekkinud erütematoosne luupus või teised kollageenhaigused, epidermise toksiline nekrolüüs (epidermis kärub ja irdub), perifeerne neuropaatia (piirdenärvisüsteemi haigestumus), segasusseisundid, millega kaasnevad koordinatsioonihäired ning üksikjuhtudel ka suu kandidoos (soor).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS GRISEOFULVIINI SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida toatemperatuuril, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage griseofulviini pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati koostõlastatud jaanuaris 2010