

## PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

### **Liothyronin, 20 µg tabletid** Naatriumliotüroniin

**Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba, ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.**

#### **Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.**

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

#### **Infolehes antakse ülevaade:**

1. Mis ravim on Liothyronin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Liothyronini võtmist
3. Kuidas Liothyronini võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Liothyronini säilitada
6. Lisainfo

### **1. MIS RAVIM ON LIOTHYRONIN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE**

Liothyronin on sünteetiliselt toodetud kilpnäärme hormoon, mida kasutatakse hüpotüreooosi (kilpnäärme alatalitluse) raviks.

### **2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE LIOTHYRONINI VÕTMIST**

#### **Ärge võtke Liothyronini**

- kui te olete allergiline (ülitundlik) naatriumliotüroniini või Liothyronini mõne koostisosa suhtes.
- kui teil on ravimata neerupealsete või adenohüpofüüsi (ajuripatsi eessagara) puudulikkus.
- kui teil on türeotoksikoos

#### **Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Liothyronin**

- kui teil on mõni südamehaigus võivad üleannustmisele omased sümptomid (vaata allpool lõik „Kui te võtate Liothyronini rohkem kui ette nähtud“) ilmned madalamate annuste juures.

#### **Võtmine koos teiste ravimitega**

Liothyronin vähendab järgmiste ravimite toimet:

- suukaudsed veresuhrut alandavad ravimid. Ravi alustamisel Liothyroniniga tuleb veresuhkru taset sagedamini jälgida.
- südameglikosiidid (südameravimid, näiteks digoksiin).

Liothyronin tugevdab järgmiste ravimite toimet:

- antikoagulandid (verehübimist pärssivad ravimid, näiteks Marevan). Ravi alustamisel Liothyroningaga tuleb vere hüübimisnäitajaid sagedamini jälgida ja vajadusel antikoagulandi annust kohandada.

Järgnevad ravimid vähendavad Liothyronini imedumist, mis tõttu tuleb neid ravimeid võtta erinevatel aegadel:

- antatsiidid ja sukralfaad (maohappe neutraliseerijad). Nende ravimite ja Liothyronini võtmise vahel peab olema ajavahe vähemalt 2 tundi.
- kaltsiumit sisaldavad ravimid ja toidulisandid. Ajavahe peab olema vähemalt 2 tundi.
- rauda sisaldavad ravimid ja toidulisandid. Ajavahe peab olema vähemalt 2 tundi.
- kolestüramiin ja kolestipool (vere kolesteroolisisaldust vähendavad ravimid). Ajavahe peab olema vähemalt 4-5 tundi.

- polüstireensulfonaat (vere liigse kaaliumisisalduse alandamiseks kasutatav ravim). Ajavahe peab olema vähemalt 4 tundi.

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

### **Rasedus ja imetamine**

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Liothyronini võib kasutada raseduse ajal.

Liothyronini võib kasutada imetamise ajal. Ravim eritub rinnapiimaga, kuid oht lapsele on vähetõenäoline.

### **Oluline teave mõningate Liothyronini koostisainete suhtes**

Liothyronin sisaldab abiainena laktoosi, kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

## **3. KUIDAS LIOTHYRONINI VÕTTA**

Võtke Liothyronini alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Tavaline algannus täiskasvanutel on 10-20 µg päevas. Eakatel peab algannus olema väiksem.

Tavaline säilitusannus täiskasvanutel on 40-60 µg päevas.

Kui teil on tunne, et Liothyronini toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

### **Kui te võtate Liothyronini rohkem kui ette nähtud**

ilmnevad kilpnäärme ületalitluse sümptomid – südamekloppimine, südame rütmihäired, kõhnumine, rinnakutagune pigistav valu, käte värisemine, peavalu, kõhulahtisus, närvilisus, unetus, higistamine ja kuumuse talumatus.

### **Kui te unustate Liothyronini võtta**

Ärge võtke kahekordset annust, kui eelmine tablett jäi võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

## **4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED**

Nagu kõik ravimid, võib ka Liothyronin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on seotud ravimi suurte annustega. Üleannustamisel ilmnevad kilpnäärme ületalitluse sümptomid (vaata lõik „Kui te võtate Liothyronini rohkem kui ette nähtud“), valud südames ning kätes ja jalgades.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

## **5. KUIDAS LIOTHYRONINI SÄILITADA**

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Liothyronini pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile (kuu ja aasta). Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. LISAINFO**

### **Mida Liothyronin sisaldab**

- Toimeaine on naatriumliotüroniin.
- Abiained on on laktoos, maisitärklis, želatiin, magneesiumstearaat, talk.

### **Kuidas Liothyronin välja näeb ja pakendi sisu**

Liothyronin on valge, ümar, kumerate pindadega tablett, mille ühel küljel on märged „T3“ ja teisel küljel poolitusjoon.

Liothyronin on saadaval 100-tabletises pakendis.

### **Müügiloa hoidja**

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

### **Tootja**

Nycomed Christiaens  
Gentsesteenweg 615  
1080 Brüssel  
Belgia

Tootja esindaja Eestis:  
Nycomed SEFA AS  
Jaama 55B  
63308 Põlva

**Infoleht on viimati koostöölstatud 03/2007**