

## PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

### Pakendi infoleht: teave kasutajale

Misoprostool  
tahke suukaudne ravimvorm, 200mikrogrammi

**Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.**

#### **Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet**

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusümptomid on sarnased
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

#### **Infolehe sisukord**

- 1.Mis ravim on misoprostool ja milleks seda kasutatakse
- 2.Mida on vaja teada enne misoprostooli võtmist
- 3.Kuidas misoprostooli võtta
- 4.Võimalikud kõrvaltoimed
- 5.Kuidas misoprostooli säilitada
- 6.Pakendi sisu ja muu teave

### **1. Mis ravim on misoprostool ja milleks seda kasutatakse**

Misoprostool on sünteetiline prostaglandiin–E<sub>1</sub> analoog, mis tekitab muutusi emakakaelas ning põhjustab emaka kokkutõmbeid, käivitades seeläbi sünnitustegevuse.

Misoprostooli kasutatakse raseduse meditsiiniliseks katkestamiseks e abordiks (embrüo või loote eemaldamine emakaõõnest ravimite manustamisega (medikamentoosselt) või kirurgiliselt.

### **2. Mida on vaja teada enne misoprostooli võtmist**

#### **Ärge kasutage misoprostooli:**

- kui teie rasedust ei ole günekoloogilise läbivaatuse, ultraheliuuringu või bioloogiliste testidega kinnitatud;
- kui te olete allergiline (ülitundlik) misoprostooli või mistahes muu prostaglandiini suhtes
- kui teil on dekompenseeritud hüpertensioon või koronaartõbi
- kui te saate antikoagulantravi (vere hüübimist takistav ravi)
- kui teil esinevad vere hüübimishäired
- kui teie arst kahtlustab emakavälise rasedust (munarakk on pesastunud väljaspool emakat);
- kui teie suguelundeid on lõigatud või ümberlõigatud;

Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne misoprostooli võtmist nõu oma arstiga.

### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Mõnedel juhtudel ei pruugi ravim teile sobida, seetõttu enne misoprostooli kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- kui teil on südameprobleemid
- kui teil on aneemia
- kui te toidate last rinnaga

Kuna misoprostool võib kahjustada loodet, seetõttu medikamentoosse abordi ebaõnnestumise korral on näidustatud kirurgiline abort.

Patsienti peab informeerima, et medikamentoosse abordiga võib kaasneda pikaajaline veritsus tupest, mis võib olla tugev.

### **Kasutamine koos teiste ravimitega**

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid. Misoprostooli toimet võivad mõjutada teised ravimid ja misoprostool võib mõjutada teiste ravimite toimet. Teavitage oma arsti, kui te peate ravi ajal võtma mistahes teisi ravimeid.

Küsi oma arstilt nõu ravimite kohta, mida te võite võtta valu vaigistamiseks.

### **Rasedus ja imetamine**

Misoprostool võib väikeses koguses erituda rinnapiima ning selle kaudu sattuda teie lapse organismi. Kuigi ravimit kasutatakse ühekordselt ja see metaboliseerub kiiresti, soovitatakse mõne tunni jooksul pärast ravimi manustamist imetamiskord vahele jätta.

Patsiendid peavad olema informeeritud, et misoprostool võib kahjustada loodet, mistõttu medikamentoosse abordi ebaõnnestumise korral on näidustatud kirurgiline abort.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Misoprostool võib teil tekitada pearinglust. Ärge juhtige autot ega töötage seadmetega enne, kui teate, kuidas see ravim teile mõjub.

## **3. Kuidas misoprostooli kasutada**

Misoprostooli tuleb kasutada alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Misoprostooli kasutamine nõuab patsiendi aktiivset osalemist.

Patsient peab medikamentoosse abordi käigus külastama arsti 2...4 korral. Kõige tavalisem on 3 visiidist koosnev skeem.

Patsiente peab teavitama sellest, et medikamentoosse abordi järgselt on kontrollvisiit (järelkontroll) kohustuslik, sest on olemas risk raseduse medikamentoosse katkestamise meetodi ebaõnnestumiseks ning ei ole teada riskid lootele (vt lõik 4.4).

- Kui kontrollvisiidil tuvastatakse meetodi ebaõnnestumine (elujõuline kestev rasedus) ja kui patsient soovib jätkuvalt rasedust katkestada, peab raseduse katkestamise lõpule viima mõne teise meetodiga.

- Kui kontrollvisiidil tuvastatakse meetodi ebaõnnestumine (elujõuline kestev rasedus) ja kui patsient soovib rasedust jätkata, pidage selles osas nõu oma arstiga, kes korraldab hoolika

sünnieelse jälgimise ja korduvad ultraheliuuringud.

Teile määratud ravimis sisalduvate abiainetete kohta teavet, palun, küsige oma raviarstilt.

### **Kui te kasutate misoprostooli rohkem kui ette nähtud**

Teid juhendatakse ravimi võtmise ajal, seega on vähetõenäoline, et te kasutate rohkem ravimit kui ette nähtud.

### **Kui te unustate misoprostooli kasutada**

Kui te unustate kasutada ravimit selle meetodi mistahes etapis, ei pruugi see meetod olla täielikult efektiivne. Rääkige oma arstiga, kui te olete unustanud ravimit kasutada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

## **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka misoprostool põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Medikamentoosse abordi käigus tekivad valulikumad emaka kokkutõmbed ja vereeritus tupest, mis on seotud abordi protsessiga.

Kõrvaltoimed võivad olla:

- Rohke ja pikenenud vereeritus, mis tavaliselt ei mõjuta hemoglobiini taset.
- Palavik 1...2 tunni jooksul pärast ravimi manustamist; kui palavik kestab üle 4 tunni või tekib järgmistel päevadel pärast ravimi manustamist, siis võib kahtlustada nakkuse olemasolu.
- Iiveldus ja oksendamine
- Kõhulahtisus, mis on kerge ja reeglina ravi ei vaja.
- Peavalu ja uimasus.
- Emaka või emakamanuste põletik, mida on kirjeldatud väga harva.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsisemaks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

## **5. Kuidas misoprostooli säilitada**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast märgit "Kõlblik kuni" või "EXP". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprüügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. Lisainfo**

### **Müügiloa hoidja**

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati koostööl lastatud juulis 2012