

**PAKENDI INFOLEHT**  
**Peratsin ® dekanooat 108 mg/ml süstelahus**

**Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.**

**Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.**

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.

**Infolehes antakse ülevaade:**

1. Mis ravim on Peratsin dekanooat ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Peratsin dekanooati kasutamist
3. Kuidas Peratsin dekanooati kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Peratsin dekanooadi säilitamine
6. Lisainfo

**Peratsin ® dekanooat 108 mg/ml süstelahus**

Perfenasiindekanooat

- Toimeaine on perfenasiindekanooat. 1 ml süstelahust sisaldab 108 mg perfenasiindekanooati
- Abiained on propüülparahüdroksübensoaat ja seesamiõli

**Müügiloa hoidja**

Orion Corporation  
Orionintie 1  
FIN-02200 Espoo  
Soome Vabariik

**Tootja**

Schering-Plough Labo N.V.  
2220 Heist O/D Berg  
Belgia

**1. MIS RAVIM ON PERATSIN DEKANOAAAT JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE**

Perfenatsiin on antipsühhootiline ravim, mida kasutatakse peamiselt raskete psüühiliste haiguste raviks. Ta leevendab psühhooosi sümptomaatikat, nagu hallutsinatsioonid ja luulud. Samuti on perfenatsiinil rahustav toime.

Ravim on ainult diagnostiliseks kasutamiseks.

Peratsin dekanooat süstelahust kasutatakse psühhootiliste ja ka ärevusseisundite raviks, eriti kui nendega koos esineb hallutsinatsioonilisi sümptomeid.

Arst võib määrata Peratsin preparaate ka teiste haiguste raviks.

**2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE PERATSIN DEKANOAAADI KASUTAMIST**

**Ärge kasutage Peratsin dekanoaati:**

- kui patsient on ülitundlik (allergiline) perfenasiindekanoaadi või Peratsin dekanoaadi mõne koostisosa suhtes.
- kui patsiendil on diagnoositud feokromotsütoom
- kui patsiendil on leitud luuüdi funktsiooni häired
- kui patsiendil on ajukahjustus

**Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Peratsin dekanoaat:**

- kui patsient põeb südame, maksa- või kopsupuudulikkust
- kui patsient põeb epilepsiat
- kui patsient põeb diabeeti (suhkrutõbi),
- kui patsiendil on diagnoositud silma siserõhu tõusu (glaukoomi)
- kui patsient põeb Parkinsoni tõbe
- kui patsiendil on suurenenud eesnääre
- kui patsiendile pole sobinud mõni teine antipsühhootiline ravim

**Rasedus**

Peratsin dekanoaadi kasutamine raseduse ajal tuleb kõne alla ainult väga suure vajaduse korral. Pidage nõu arstiga, kui olete rase või plaanite rasedust Peratsin ravi ajal.

**Imetamine**

Perfenasiin eritub piimaga, kuid see kogus on nii väikene, et sellel ei ole halbu toimeid imikule. Pidage nõu arstiga, kui kavatsete imetada Peratsin ravi ajal.

**Autojuhtimine ja masinatega töötamine:**

Peratsin võib eriti ravi alguses vähendada reaktsioonikiirust liikluses ja muudes täpsust vajavates tegemistes. Seetõttu on soovitatav olla ettevaatlik, kuni on selge ravimi individuaalne mõju.

**Oluline teave mõningate Peratsin dekanoaati koostisainete suhtes:****Kasutamine koos teiste ravimitega:**

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teiste ravimite samaaegne kasutamine võib nii tugevdada kui ka vähendada Peratsin preparaadi toimet. Sellisteks ravimiteks on teiste hulgas kesknärvisüsteemi toimivad ained (näiteks, rahustavad ravimid, uinutid, antidepressandid, epilepsia vastased ravimid, alkohol), antihistamiinikumid ehk allergiavastased ravimid, mõned vererõhu ravimid (näiteks tramadool, kodeiin) ja maohaavandi ravimid.

Suitsetamine nõrgendab perfenasiini tõhusust.

**3. KUIDAS KASUTADA PERATSIN DEKANOAAATI**

Tavaliselt alustatakse ravi Peratsin tablettidega. Peratsin dekanoaat süstelahust kasutatakse tavaliselt haigla tingimustes, kus üritatakse saavutada vähimat toimivat ravimi annust.

Annus on ühekordne. Tavaline ühekordne annus on 0,5-2 ml (54-216mg), mida manustatakse sügavale lihasesse **2-4 nädala** tagant.

Peratsin dekanoaati ei või süstida veeni. Nõel ja süstal peavad olema kuivad kuna niiskus võib lahust hägustada.

Arst määrab Teile vajaliku annuse. Järgige alati arsti ettekirjutusi.

### **Tähelepanu!**

Peratsini ravi ei tohi lõpetada äkitselt, annust tuleb vähendada astmeliselt ärajäämanähtudest hoidumiseks.

Patsienti peab ka hoiatama võimalike ekstrapüramidaalsüsteemi nähtude avaldumisest peale süsti.

Kui Teil on tunne, et Peratsin dekanooadi toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

### **Kui te kasutate Peratsin dekanooati rohkem kui ette nähtud:**

Raske perferasiini üleannustamise nähtudeks on kesknärvisüsteemi halvatus ja lihaskrambid.

Nähud on kõige tugevamad kuni 24 tundi peale üleannust.

Kui haige kahtlustab üleannustamist, tuleb võtta kindlasti ühendust arstiga.

### **Kui te unustate Peratsin dekanooati võtta:**

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

### **Toimed, mis tekivad pärast ravimi Peratsin dekanooadi kasutamise lõpetamist:**

## **4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED**

Nagu kõik ravimid, võib ka Peratsin dekanooat põhjustada kõrvaltoimeid.

Eriti ravi alguses võib perferasiin tekitada väsimust, kuid see siiski möödub ravi jätkudes.

Perferasiini harvemad kõrvalnähud on lihaskrambid, motoorne rahutus (näiteks võimetus olla rahulikult paigal), värinad ja jäikus. Eriti harva võib esineda sümptomite kooslust kuhu kuuluvad krambid, palavik, lihasjäikus ja aeglane teadvuse kadu. Pikaajaline perferasiini kasutamine võib tekitada ka sundliigutusi ja suuümbruse lihaste värinaid. Lisaks võib perferasiin tekitada suukuiivust, urineerimishäireid, lühinägemise halvenemist, südame löögisageduse tõusu, kõhukinnisust, mäluhäireid, uimasust, menstruaatsiooni häireid, rindade kasvu ja hellust, karvakasvu intensiivistumist, söögiisu ja kehakaalu muutumist ning halba enestunnet, pikenenud erektsiooni ning liibido muutusi.

Tundlikkus perferasiinile võib väljenduda ka nahanähtudena nagu nõgestõve, lööbe, sügeluse või naha valgustundlikkusena.

Perferasiin nagu teisedki antipsühhootikumid tekitavad umbes kolmandikul patsientidel kergeid verepildi muutusi. Tõsised verepildi muutused on aga väga harvad.

Patsient peaks rääkima oma raviarstile ka kõigist teistest ravi ajal tekkinud kaebustest.

## **5. PERATSIN DEKANOAAADI SÄILITAMINE**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Hoida temperatuuril 15 °C...25 °C.

Hoida valguse eest kaitstult.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

## **6. LISAINFO**

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Orion Pharma Eesti OÜ  
Lastekodu 5-24, 10115 Tallinn  
Tel/Faks 6 616 863

**Infoleht on viimati koostatud Veebruar 2004**