

## PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

### Pakendi infoleht: teave kasutajale

#### Etanool, 95%, 96%, parenteraalne ravimvorm

## Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

### Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

### Infolehe sisukord

1. Mis ravim on etanool ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne etanooli kasutamist
3. Kuidas etanooli kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas etanooli säilitada
6. Muu teave

#### 1. Mis ravim on etanool ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine etanool on alkohol.

Etanool toimib kui metanooli antidoot (vastumürk), kuna oküdeerub organismis metanoolist kiiremini ja takistab seeläbi metanooli lagundamist maksas.

Etanooli kasutatakse metanooli ja teiste alkoholide mürgistuse raviks.

#### 2. Mida on vaja teada enne etanooli kasutamist

##### Eriline ettevaatus on vajalik:

- patsiendi puhul, kes on rase või toidab last rinnaga
- patsiendi puhul, kes on etanooli suhtes allergiline

### Muud ravimid ja etanool

Eriline ettevaatus on vajalik, kui etanooli kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:

- Und soodustavad ravimid, nagu nitraspaam
- Antihistamiinikumid, nagu kloorfeniramiin ja prometasiin (kasutatakse allergiate korral)
- Lihaslõõgastid, nagu atrakuurium
- Tugevad valuvaigistid, nagu morfiin
- Epilepsia korral kasutatavad ravimid, nagu fenütoiin
- Depressioonivastased ravimid, nagu amitriptüliin ja imipramiin
- Rahustid, nagu diasepaam
- Insuliin ja diabeedivastased ravimid, sest alkohol võib omakorda veresuhkru taset langetada
- Metronidasool (kasutatakse kuseteede infektsioonide raviks)
- Tsefalosporiinid, nagu tsefaleksiin ja tsefakloor (kasutatakse infektsioonide raviks)
- Vererõhku langetavad ravimid, nagu AKE-inhibiitorid, beeta-blokaatorid, kaltsiumi kanali blokaatorid.
- Verd vedeldavad ravimid, nagu varfariin

**Ükskõik millise ravimi kasutamisel koos etanooliga, tuleb olla ettevaatlik.** Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

### **Rasedus, imetamine ja viljakus**

Eriline ettevaatus on vajalik patsiendi puhul, kes on rase või toidab last rinnaga.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Etanooli manustamise järgselt ei tohi juhtida autot ega töötada masinatega.

## **3. Kuidas etanooli kasutada**

Seda ravimit manustab tervishoiutöötaja. Etanooli mansuatakse intravenoosse infusioonina 30 minuti jooksul.

Ravimi täpse annuse üle otsustab arst, see sõltub patsiendi kehakaalust ja tervislikust seisundist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

## **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ravimi manustamine tuleb koheselt lõpetada, kui patsiendile tekib mõni järgmistest sümptomitest:

- Hingamis- ja neelamisraskused
- Näo, huulte, keele ja hingamisteede turse
- Nahalööve

Etanool võib põhjustada ka järgmisi kõrvaltoimeid

Koordinatsioonihäired

Meeleolu muutused

Ähmane nägemine

Ebaselge kõne

Väsimus

Mäluhäired

Külmatunne

Veresuhkru taseme langus

Teadvusehäired

Hingamisraskused

Kooma

Südamepuudulikkus

### **Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## **5. Kuidas etanooli säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. Muu teave**

### **Müügiloa hoidja**

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

**Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2017.**