

## PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

### Pakendi infoleht: teave kasutajale

#### Permetriin, 50mg/g , geel

### Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

#### Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

#### Infolehe sisukord

1. Mis ravim on permetriin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne permetriini kasutamist
3. Kuidas permetriini kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas permetriini säilitada
6. Muu teave

#### 1. Mis ravim on permetriin ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine permetriin on nahaparasiitide vastane ravim, mida kasutatakse sügeliste raviks.

Permetriini kasutatakse ainult välispidiselt.

Permetriin geel sisaldab abiainena kinifurüüli, mis omab antibakteriaalset toimet gram-positiivsetele mikroorganismidele, sh stafülokokkidele ja streptokokkidele.

#### 2. Mida on vaja teada enne permetriini kasutamist

##### Ärge kasutage permetriini:

- kui olete permetriini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline
- kui olete allergiline korvõieliste (sh krüsanteemid) suhtes
- alla 2 kuu vanustel lastel

Teavet selles ravimis sisalduvate abianete kohta küsige oma arstilt.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

#### Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Permetriini sisaldavat geeli tohib kasutada ainult välispidiselt. Vältida tuleb geeli sattumist silma, suhu, jm limaskestadele.

Kui geel satub silma, tuleb silmi rohke veega loputada.

Allaneelamise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole.

Permetriini sisaldava geeli kasutamine võib süvendada ekseemi.

Kui geeli kasutamise korral tekib teil nahaärritus, lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge arsti poole.

#### Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei tohi kasutada alla 2 kuu vanustel lastel.

Väikelastel pole selle ravimiga viidud läbi kliinilisi uuringuid, seetõttu tohib perimetriin geeli kasutada alla 2-aastastel lastel ainult arsti soovitusel ja järelevalve all.

### **Muud ravimid ja perimetriin**

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Koostoimetest perimetriini ja teiste ravimite vahel ei ole teatatud.

**Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos perimetriiniga.** Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

### **Rasedus, imetamine ja viljakus**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Perimetriini mõju lootele ei ole uuritud, seepärast võib perimetriini kasutada raseduse ajal ainult pärast konsulteerimist arstiga, kes oskab arvestada kõiki võimalikke riske.

Perimetriin imendub rinnapiima. Kuid võttes arvesse, et ravimit kasutatakse väikeses annuses, lühikest aega ja ainult lokaalselt, satub ravimit rinnapiima ainult väga väikeses annuses, mistõttu on vähetõenäoline, et see võiks mõjutada rinnapiima saavat last.

Vältida tuleb imiku kokkupuudet ema nahale kantud ravimiga. Imetav ema peab jälgima, et ravimit ei satuks rindadele.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Ei ole teada, et perimetriin mõjutaks auto juhtimise või masinatega töötamise võimet.

## **3. Kuidas perimetriini kasutada**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Perimetriin geeli kasutatakse ainult välispidiselt.

Geel tuleb kanda õhukese kihina puhtale ja kuivale nahale kohal, kus on näha haiguse (sügelised) tunnuseid, ning hõõruda see naha sisse.

#### Täiskasvanud

Pärast 24 tunni möödumist geeli peale kandmisest peab patsient ennast seebiga puhtaks pesema ning vahetama seejärel riided.

Kui geeli kasutamise järgselt haigustunnused ei taandu, tekivad pärast esialgset taandumist uuesti või levib haigus edasi järgmistele kehapiirkondadele, tuleb geeli kasutada uuesti. Geeli võib kasutada järjest maksimaalselt 5 korda. Kui pärast ravimi 5-kordset kasutamist haigus ei taandu, pöörduge arsti poole.

#### Kasutamine lastel

Väikelastel pole selle ravimiga viidud läbi kliinilisi uuringuid, seetõttu tohib perimetriin geeli kasutada alla 2-aastastel lastel ainult arsti soovitusel ja järelevalve all.

Perimetriin geeli ei tohi kasutada alla 2 kuu vanustel lastel.

Alla 3-aastastel lastel tuleb geel seebiga maha pesta ja riided vahetada juba 12 tundi pärast geeli kasutamist. Kui haigusnähud ei taandu, tekivad uuesti või levib haigus edasi järgmistele

kehapiirkondadele võib geeli uuesti kasutada alles pärast 2 päeva möödumist geeli esmasest peale kandmisest. Geeli võib uuesti kasutada ainult ühe korra. Kui seejärel haigus ei taandu, pöörduge arsti poole.

Üle 3-aastaste laste puhul tuleb geel seebiga maha pesta ja riided vahetada 24 tundi pärast peale kandmist. Kui haigusnähud ei taandu, tekivad uuesti või levib haigus edasi järgmistele kehapiirkondadele võib geeli uuesti kasutada alles pärast 1-2 päeva möödumist geeli esmasest peale kandmisest. Geeli võib uuesti kasutada maksimaalselt 5 korda. Kui seejärel haigus ei taandu, pöörduge arsti poole.

### **Kui te kasutate permetriini rohkem kui ette nähtud**

Kui te olete geeli liiga palju nahale kandnud, peske või pühkige üleliigne ravim nahalt ära. Kui tekib nahaärritus, pöörduge arsti poole.

Kui geel on satub silma, tuleb silmi rohke veega loputada.

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või keegi teine on permetriin geeli alla neelanud. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

### **Kui te unustate permetriini kasutada**

Kasutage unustatud annus niipea kui võimalik.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

## **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Permetriin võib põhjustada naha sügelemist, torkimis- või kõrvetustunnet, naha kuivust, löövet. Üksikjuhtudel on kirjeldatud naha muutumist tundetuks, turset, naha pigmentatsiooni muutusi. Kõrvaltoimete tekkimise korral tuleb ravimi kasutamine lõpetada ja võtta ühendust arstiga.

### **Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## **5. Kuidas permetriini säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. Muu teave**

### **Müügiloa hoidja**

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

**Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2017.**