

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Pilokarpiinvesinikkloriid, 20 mg/ml, silma manustatav ravimvorm

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on pilokarpiin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne pilokarpiini kasutamist
3. Kuidas pilokarpiini kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas pilokarpiinvesinikkloriidi säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on pilokarpiin ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine pilokarpiin kuulub miotikumide e. silma pupilli ahendavate ainete hulka.

Pilokarpiini kasutatakse primaarse suletudnurga glaukoomi raviks.

Suletudnurga glaukoom tekib siis, kui silma eeskambri nurk suletakse iirise e. vikerkesta poolt ja vesivedeliku äravool eeskambrist on takistatud. Sellisel juhul tõuseb silma siserõhk, millega võib kaasneda silma tugev valu ja nägemise halvenemine. Silma siserõhu tõus kahjustab nägemisnärv, mis põhjustab vaatevälja ahenemist. Pikemat aega püsiv kõrge silma siserõhk võib põhjustada ulatuslikku nägemishäiret, isegi nägemise täielikku kaotust.

Pilokarpiin kutsub esile silma ripslihase kontraktsiooni. Selle tagajärjel avaneb trabekulaarvõrgustik ja silma pidevalt juurde tekkiv vesivedelik saab silma eeskambrist trabekulaarvõrgustiku kaudu ära voolata. Selle tagajärjel langeb silma siserõhk.

2. Mida on vaja teada enne pilokarpiini kasutamist

Ärge kasutage pilokarpiini:

- kui olete pilokarpiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline.
- kui teil on varasemalt esinenud allergilist reaktsiooni teiste miotikumide kasutamise korral.
- kui teil on mingi silmahaigus, mille korral ei tohi silma pupilli ahendada (nt äge vikerkesta põletik, teatud sekundaarse glaukoomi vormid).
- samaaegselt kontaktläätsede kasutamisega.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne pilokarpiini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- kui teil on südamehaigus, nt südamepuudulikkus.
- kui teil on astma.
- kui teil on maohaavand.
- kui teil on kõrge vererõhk.

- kui teil on raskusi urineerimisega.
- kui teil on Parkinsoni tõbi.
- kui teil on samaaegselt teisi silmaprobleeme.

Lapsed ja noorukid

Pilokarpiin on näidustatud vajadusel ka lastele ja noorukitele. Täpse annuse ja ravi kestuse määrab raviarst.

Muud ravimid ja pilokarpiin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriline ettevaatus on vajalik, kui pilokarpiini kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:

- Kortikosteroidid (sh. tableti või kreemina)
- Ravimid, mis kuuluvad antikolinergiliste ravimite hulka
- Antihistamiinideks nimetatavad allergiavastased ravimid
- Petidiin (valu vaigistav ravim)
- Depressiooni vastased ravimid
- Kõik silma pupilli ahendava toimega ravimid.

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib kasutada koos pilokarpiiniga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim ahendab teie silma pupille ja mõjutab seeläbi teie silmade võimet kindlale punktile fokuseeruda ja näha pimedas. Lisaks, nagu kõik silma manustatavad ravimid võib ka pilokarpiinvesinikkloriid põhjustada ähmast nägemist. Seetõttu ärge juhtige autot ega töötage masinatega seni, kuni ravimi toime on möödunud ja teie nägemine on taastunud.

3. Kuidas pilokarpiini kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst ütleb teile, kui palju ja kui pika aja vältel te pilokarpiini kasutama peate.

Ravimi manustamine:

Esmalt peske käed.

Manustage ravimit alati peegli ees.

Kuivatage õrnalt puhta taskurätikuga oma silmi.

Avage ravimi pudel.

Tõmmake oma alumist silmalaugu õrnalt silmast natuke eemale ja tilgutage seejärel ravimit (tavaliselt 1-2 tilka) alumise silmalau ja silmamuna vahele.

Sulgege korraks silm ja seejärel pilgutage veel mõned korrad silma, et ravim jaotuks ühtlaselt kogu silmamunale.

Sulgege silmad. Soovitatav on seejärel u 3 minuti jooksul õrnalt haige silma sisemurgale vajutada, et takistada ravimi voolamist pisarakanali kaudu ninna ja kurku. See on eriti soovitatav ravimi

manustamisel lastele, eakatele ja patsientidele, kellel on suurem risk süsteemsete kõrvaltoimete tekkeks.

Kui te manustate pilokarpiini rohkem kui ette nähtud

Pilokarpiinvesinikkloriidi silma manustamisel on üleannustamine ebatõenäoline.

Kuid kui teie või keegi teine on manustanud nt suukaudselt suure annuse seda ravimit, siis pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

Kui te unustate pilokarpiini kasutada

Manustage unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg manustada järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate pilokarpiini kasutamise

Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Pilokarpiin võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid

Kõige sagedamini esineb silmadega seotud kõrvaltoimeid:

Põletustunne, sügelemine, torkimistunne, ebamugavustunne silmas või silma ümber, silmade punetus, verevalum silmas, ähmane nägemine, häiritud silmade fookuseerumine kindlale esemele/punktile, häiritud silmade kohanemine hämarusega.

Esineda võib peavalu, sagedamini noorematel patsientidel ja ravi alguses.

Süsteemseid kõrvaltoimeid esineb harvemini. Nendeks võivad olla vererõhu langus, südame löögisageduse vähenemine, õhupuudus, higistamine, iiveldus, kõhulahtisus, suurenenud pisaratevool silmast, suurenenud süljevool.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas pilokarpiinvesinikkloriidi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud detsember 2016.