

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

DIACARB, 250 mg tabletid Atsetasoolamiid

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel,

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile

Infolehes antakse ülevaade:

- 1.Mis ravim on Diacarb ja milleks seda kasutatakse
- 2.Mida on vaja teada enne Diacarb'i võtmist
- 3.Kuidas Diacarb'i võtta
- 4.Võimalikud kõrvaltoimed
- 5.Kuidas Diacarb'i säilitada
- 6.Lisainfo

1. MIS RAVIM ON DIACARB JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Diacarb kuulub uriinieritust suurendavate ainete (salureetikumide) gruppi. Toimemehhanism seisneb ensüüm karboanhüdraasi funktsiooni pärssimises. Ensüüm karboanhüdraas on oluline ionide transpordisüsteemis ja organismi ionide tasakaalu säilitamiseks. Selle ensüümi pärssimise tulemusena suureneb naatriumi, kaaliumi ja bikarbonaatide eritamine, suureneb uriini hulk ja väheneb uriini pH, kuna aluselise reaktsiooniga ammoniumioon eritub. Preparaat imendub seedetraktist kiiresti. Suukaudse manustamise järel saabub toime 1 tunni möödumisel, toime kestab 6...8 tundi. Diacarb eritub organismist peamiselt (50...70%) neerude kaudu muutumatul kujul maksimaalselt 24 tunni jooksul. Diacarb'i näidustuseks on naatriumi ja vee peetus organismis.

Ravimit kasutatakse vereringehäiretest, neerufunktsiooni häiretest põhjustatud tursete korral, kopsuemfüseemi raviks ja silmasisese rõhu alandamiseks esmase ning teisese glaukoomi korral ja epilepsia ravis (koos teiste antiepileptikumidega).

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE DIACARB'I VÕTMIST

Ärge kasutage Diacarb'i

- Kui te olete ülitundlik (allergiline) atsetasoolamiidi, sulfoonamiidide või ravimi mõne koostisosa suhtes
- kui teil on atsidoos (vere liigne happesisaldus)
- kui teil on Addison'i tõbi (neerupealise haigus)
- kui teil on hüpokloreemia ja/või hüpokloruuria
- kui teil on hüpokaleemia
- kui teil on suhkurtõbi
- kui teil on maksatsirroos
- pikaajaliselt teatud tüüpi glaukoomide korral

Informeerige arsti enne ravimi kasutamist, kui teil on mõni eelpool nimetatud haigustest.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Diacarb

Ravimi pikaajalisel kasutamisel on vajalik kontrollida elektrolüütide taset vereseerumis ja verepilti.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Diacarb'iga kooskasutamisel võib fenütoiini ja karbamasepiini sisaldus veres suureneada, primidooni sisaldus väheneda. Samaaegselt ei tohi kasutada karboanhüdraasi inhibiitoreid.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ajal ei tohi kasutada.

Kui te olete rase või planeerite rasestuda või toidate last rinnaga, informeerige oma arsti enne ravimi tarvitamist.

Diacarb'i võib kasutada rinnaga toitmise ajal ainult arsti loal

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Diacarb'i suured annused võivad põhjustada uimasust ja tundlikkushäireid (paresteesiaid). Võivad tekkida ka pearinglus ja nägemishäired.

Seetõttu ravi ajal Diacarb'iga ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme.

3. KUIDAS DIACARB'I VÕTTA

Ravimi annuse määrab arst, see oleneb Teie haiguse raskusest.

Erineva põhjusega tursed: tavaline annus on 0,125...0,25g 1...2 korda ööpäevas 2päeva jooksul.

Epilepsia: tavaline annus on 0,25g 3...4 korda päevas.

Glaukoom: ravi alustada annusega 0,25...0,5g, hiljem manustada 0,25g iga 6 tunni järel. Ravi efekti saabumisel annust pidevalt vähendada kuni 0,25g-ni 2...3 korda ööpäevas. Ravikuuri kestus 4...5 päeva.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Diacarb põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Preparaat on üldiselt hästi talutav. Raviannuste ületamisel ja pikaajalisel kasutamisel võib tekkida veres kaaliumivaegus, võivad tekkida unisus, väsimus, pearinglus ja peavalu, loidus, desorientatsioon. On täheldatud nägemishäireid, seedetraktihäiretena iiveldust, kõhulahtisust.

Väga harva on esinenud paresteesiaid (tundlikkuse häired), allergilisi reaktsioone, palavikku, leukopeeniat (vere valgeliblede vähesus), hemolüütilist aneemiat, luuüdi kahjustust.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate endal mõnda

kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

5. KUIDAS DIACARB'I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud, kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C

Hoida kuivas, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage Diacarb'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakrндil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Diacarb sisaldab

Toimeaine on atsetasoolamiid.

1 tablett sisaldab 0,25g (250mg) atsetasoolamiidi (atsetüülamiin-5-sulfoonamiid-1,3,4-tiodiasoolina).

Kuidas Diacarb välja näeb ja pakendi sisu

Tabletid 250 mg.

Pakendis 20 tabletti.

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Tootja

“POLFARMA” S.A.

ul. Pelplinska 19

83 200 Starograd Gdanski

Poola

Infoleht on viimati koostõlastatud mätsis 2009