

PAKENDI INFOLEHT

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on E-Z-HD ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne E-Z-HD kasutamist
3. Kuidas E-Z-HD kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas E-Z-HD säilitada
6. Lisainfo

E-Z-HD, suukaudse suspensiooni pulber

Baariumsulfaat

1. MIS RAVIM ON E-Z-HD JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Ravim on ainult diagnostiliseks kasutamiseks

E-Z-HD kasutatakse söögitoru, mao ja kaksteistsõrmiku topelt kontrast radiograafias.

Toimeaine on baariumsulfaat, mis on vees praktiliselt lahustumatu ja ei oma farmakoloogilist mõju.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE E-Z-HD KASUTAMIST

Ärge kasutage E-Z-HD'i:

- kui te olete ülitundlik baariumsulfaadile või E-Z-HD mõne koostisosa suhtes.
- kui teil esineb mao või soolte perforatsioon

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga E-Z-HD:

- kui te põete bronhiaalastmat
- kui teil on esinenud atoopiat nt heinapalavikku või atoopilist ekseemi
- kui teil esineb neelamishäireid

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mõjusid autojuhtimis- ja masinate kasutamise võimele ei ole täheldatud

Võtmine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

3. KUIDAS E-Z-HD KASUTADA

Kasutage E-Z-HD alati vastavalt arsti juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga. Kui teil on tunne, et E-Z-HD toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

E-Z-HD on suukaudseks manustamiseks.

E-Z-HD annus ja kontsentratsioon sõltub vajamineva kontrasti hulgast ja astmest uuritavates piirkondades, samuti kasutatavast tehnikast ning varustusest.

Tavaline täiskasvanu annus: 65...135 ml.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka E-Z-HD põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimetest on esinenud allergilisi reaktsioone, iiveldust ja harva kõhulahtisust või kõhukinnisust.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsisemaks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

5. KUIDAS E-Z-HD SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.